

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Bollettino N°37 - MODELLI PREVISIONALI PATOGENI

Situazione fitosanitaria al 5 agosto 2026

Meteo

	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer
Bologna	 37° 24°	 38° 24°	 34° 22°	 33° 22°	 34° 23°	 36° 23°	 35° 23°	 34° 23°
Ravenna	 33° 23°	 34° 24°	 33° 23°	 31° 22°	 32° 22°	 33° 22°	 33° 23°	 32° 22°
Ferrara	 38° 25°	 38° 24°	 35° 22°	 33° 23°	 35° 23°	 36° 23°	 36° 23°	 36° 23°
Forlì-Cesena	 36° 24°	 37° 24°	 34° 22°	 32° 22°	 33° 22°	 34° 23°	 35° 23°	 34° 23°
Rimini	 33° 25°	 33° 26°	 32° 23°	 31° 23°	 31° 23°	 32° 23°	 32° 24°	 32° 24°
Modena	 38° 24°	 37° 23°	 34° 22°	 33° 22°	 34° 22°	 36° 23°	 35° 23°	 34° 22°

Periodo mediamente importante dal punto di vista fitosanitario per le seguenti avversità:

Maculatura bruna del pero

Glomerella del melo

Peronospora pomodoro

Melo

Glomerella del melo

Presenza sporadica in biologico di Colletotrichum

Le infezioni sulle varietà sensibili (Gala, Golden, Pink Lady, Grany Smith) avvengono in base a condizioni climatiche caratterizzate da temperatura elevata (da 16°C a 34°C con valori ottimali da 26 a 30°C) e piogge con prolungato periodo di bagnatura.


Rischio Infettivo: BASSO



Legenda

Rischio BASSO: <40

Rischio MEDIO: >40 <60

Rischio ALTO: >60





Pero

Maculatura bruna

Presenza sporadica su foglia e frutto

Bassa presenza di conidi aerodiffusi. Al momento BASSA presenza di conidi di *S.vesicarium*

I conidi dopo una pioggia e con l'innalzarsi della temperatura media durante le interruzioni di bagnatura possono incrementarsi e causare infezione se entro i primi due-tre giorni intercettano ulteriori piogge o bagnature.

Monitoraggio aerobiologico conidi di *S.vesicarium*

Modena (Nonantola)

10-lug	2
11-lug	2
12-lug	15
13-lug	28
14-lug	4
15-lug	6
16-lug	29
17-lug	20
18-lug	13
19-lug	5

Bologna

25-lug	2
26-lug	4
27-lug	0
28-lug	1
29-lug	5
30-lug	1
31-lug	2
01-ago	2
02-ago	3
03-ago	1

Ferrara

25-lug	1
26-lug	0
27-lug	0
28-lug	10
29-lug	2
30-lug	0
31-lug	2
01-ago	5
02-ago	1

Ferrara (Fossalta)

19-lug	1
20-lug	0
21-lug	1
22-lug	1
23-lug	2
24-lug	0
25-lug	1
26-lug	2
27-lug	2
28-lug	1


Rischio sporulazione: BASSO

Rischio infezione: MEDIO-BASSO


Prevista scarsa sporulazione e presenza di spore aerodiffuse in seguito alla pioggia.

Proteggere la vegetazione poco prima della pioggia (se in periodo piovoso) o entro i primi due giorni dopo la pioggia (se si proviene da almeno una settimana asciutta).


Bomporto 2026




Alfonsine 2026




Finale Emilia



San Bartolomeo 2026



Copparo 2026



Pomodoro

Peronospora (*Phytophthora infestans*)


Soglia di pressione infettiva al di sopra della quale è raccomandata il ripristino della copertura fungicida:
2,56

Pressione infettiva: BASSA

Rischio infettivo: BASSO

POMODORO, Peronospora del pomodoro – potenziale infettivo [IPI]

Indice cumulato 7gg (n.): data 05/08/2026



RISO

Brusone del riso (*Pyricularia oryzae*)

Sporulazione: sulle graminacee spontanee, semente e residui colturali infetti, con temperatura di 25-28°C e elevata umidità relativa o prolungate bagnature, vengono prodotte le spore asessuate (conidi) la cui dispersione viene favorita da vento e pioggia o rugiada la cui durata superi le 10-12 ore con temperatura di 21°C circa.

L'infezione: avviene quando i conidi si depositano sui tessuti vegetali suscettibili e, durante le ore notturne con temperatura ottimale di 25-28°C e saturazione dell'aria, germinano producendo un tubetto germinativo e un appressorio. La penetrazione del fungo avviene con temperature ottimali di (24°C) e da periodi prolungati di elevata umidità (più di 12 ore con Ur > 90%), condizioni facilmente raggiungibili in risaie allagate.

Monitoraggio aerobiologico

19-lug	0
20-lug	4
21-lug	0
22-lug	1
23-lug	0
24-lug	0
25-lug	0
26-lug	0
27-lug	1
28-lug	0
29-lug	0

30-lug	0
--------	---

Rischio sporulazione: BASSO

Rischio infettivo: BASSO