

















































SERVIZIO FITOSANITARIO  
 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Bollettino N°29 - MODELLI PREVISIONALI PATOGENI**

Situazione fitosanitaria al 30 giugno 2026

Meteo

	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar
Bologna	 35° 24°	 35° 19°	 28° 20°	 32° 20°	 32° 19°	 33° 20°	 33° 21°	 32° 21°
Ravenna	 35° 24°	 36° 21°	 28° 22°	 31° 21°	 29° 19°	 31° 21°	 32° 22°	 31° 21°
Ferrara	 36° 23°	 36° 21°	 30° 21°	 33° 21°	 32° 19°	 34° 21°	 34° 22°	 33° 21°
Forlì-Cesena	 35° 24°	 36° 20°	 26° 20°	 30° 20°	 30° 19°	 32° 21°	 32° 22°	 31° 22°
Rimini	 33° 25°	 33° 21°	 27° 22°	 29° 22°	 29° 19°	 29° 22°	 29° 23°	 29° 22°
Modena	 34° 23°	 35° 19°	 29° 19°	 33° 20°	 33° 19°	 34° 20°	 34° 21°	 33° 21°

**Periodo mediamente importante dal punto di vista fitosanitario per le seguenti avversità:**

Peronospora vite

Maculatura bruna del pero

Glomerella del melo

Peronospora pomodoro

## Melo

### Ticchiolatura

Potenziale ascosporico esaurito

Rischio infettivo solo in presenza di infezioni secondarie in campo

### Glomerella del melo

Le infezioni sulle varietà sensibili (Gala, Golden, Pink Lady, Grany Smith) avvengono in base a condizioni climatiche caratterizzate da temperatura elevata (da 16°C a 34°C con valori ottimali da 26 a 30°C) e piogge con prolungato periodo di bagnatura.



**Rischio Infettivo: BASSO**



#### Legenda

Rischio BASSO: <40

Rischio MEDIO: >40 <60

Rischio ALTO: >60





## Pero

### Ticchiolatura

Potenziale ascosporico esaurito

Rischio infettivo solo in presenza di infezioni secondarie in campo

### Maculatura bruna

Presenza sporadica su foglia e frutto

### **Bassa presenza di conidi di *S.vesicarium***

I conidi dopo una pioggia e con l'innalzarsi della temperatura media durante le interruzioni di bagnatura possono incrementarsi e causare infezione se entro i primi due-tre giorni intercettano ulteriori piogge o bagnature.

### Monitoraggio aerobiologico conidi di *S.vesicarium*

### Modena (Nonantola)

15-giu	0
16-giu	4
17-giu	2
18-giu	0

19-giu	2
20-giu	1
21-giu	3
22-giu	1
23-giu	4
24-giu	2
25-giu	4

### Bologna

13-giu	2
14-giu	2
15-giu	3
16-giu	0
17-giu	1
18-giu	4
19-giu	2
20-giu	1
21-giu	2
22-giu	3

### Ferrara

13-giu	1
14-giu	2
15-giu	0
16-giu	4
17-giu	3
18-giu	1
19-giu	2
20-giu	3
21-giu	1

### Ferrara (Fossalta)

15-giu	1
16-giu	3
17-giu	1
18-giu	4
19-giu	1
20-giu	4
21-giu	1
22-giu	0

**Rischio infezione: MEDIO-ALTO**


**Rischio sporulazione: ALTO (dopo la pioggia prevista)**

**Previsto un rischio di sporulazione e infezione in seguito alla pioggia prevista per il 2-3 luglio.**


**Dove fosse piovuto anche il 29 giugno è consigliabile trattare prima della pioggia prevista per il 2-3 luglio.**

**Dove non fosse piovuto è consigliabile proteggere la vegetazione entro i primi due giorni dopo la pioggia.**


Copparo 2026




### San Bartolomeo 2026




### Finale Emilia



### Alfonsine 2026



### Bomporto 2026



# VITE

## **Peronospora (*Plasmopara viticola*)**

Comparsa i sintomi di peronospora a Forlì, Modena, Reggio-Emilia, Ravenna ma infezioni di scarsa entità

Potenziale oosporico praticamente esaurito: dal 92 al 99%. Rimasta qualche famiglia di oospore nelle aree pedecollinari

Graf 1. Presenza di zoospore sulla lettiera che potrebbero intercettare possibili piogge e infettare in presenza di tessuti vegetali suscettibili e popolazioni di oospore che sono già germinate



Graf 2. Presenza di oospore che hanno terminato la fase di germinazione

Graf 3. Presenza di oospore dal 90 al 100 della fase di germinazione e che potrebbero terminare la germinazione e intercettare le piogge per dare infezione nei prossimi 3-4 giorni.

**Rischio infettivo: BASSO**


## VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]

Sulle foglie (fraz.): data 30/06/2026




### VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]

Germinate (fraz.): data 30/06/2026



### VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]



In germinazione (90 - 100) (fraz.): data 30/06/2026



**Aree di possibili infezioni primarie di peronospora**



### VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]

Infezione (qtà) (fraz.): data 29/06/2026



### VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]

Infezione (qtà) (fraz.): data 02/07/2026



Oidio (*Uncinula necator*)

### Comparsa di sintomi di oidio primario

Possibile inizio anche della fase epidemica conidica se persiste un clima asciutto per almeno due settimane. Le piogge in questa fase, al contrario, riducono il rischio di sviluppo epidemico.

**Rischio sviluppo epidemico: ALTO**

## Patata & Pomodoro

**Peronospora (*Phytophthora infestans*)**

Soglia di pressione infettiva al di sopra della quale è raccomandata il ripristino della copertura fungicida:  
2,56

**Pressione infettiva: BASSA**

**Rischio infettivo: BASSO**

**POMODORO, Peronospora del pomodoro – potenziale infettivo [IPI]**  
Indice cumulato 7gg (n.): data 30/06/2026

