

Andamento e dinamica di popolazione di cimice asiatica e di altri fitofagi delle pomacee


Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena

29 ottobre 2024

Cimice asiatica

andamento catture adulti


(media 19 trappole)



andamento catture


neanidi

(media 19 trappole)



andamento catture ninfe

(media 19 trappole)











— 2020 — 2021 — 2022 — 2023 — 2024

— 2020 — 2021 — 2022 — 2023 — 2024

— 2020 — 2021 — 2022 — 2023 — 2024


Cimice asiatica





Carpocapsa


Catture 2024 (media 7
trappole)




Output modello MRV:

- Inizio primo volo: 7-10
aprile
- Picco primo volo: 11-15
maggio
- Fine primo volo: 11-15
maggio

Carpocapsa



Contarinia (e tentredini)



- Popolazioni non elevate
- Anticipo comparsa insetto rispetto alla fase sensibile
- Fioritura rapida
- Fioriture e produzioni abbondanti

Altri fitofagi

- Ricamatori (presenze in biologico di Pandemis o Archips in leggero aumento rispetto agli ultimi anni)
- Fillominatori (presenze diffuse di Litocollete e Cemiosstoma, con danni presenti solo occasionalmente)
- Eriofide vescicoloso (presenza diffusa, segnalazione danni gravi)
- Metcalfa (presenze abbondanti con danni