

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Bollettino N°1 - MODELLI PREVISIONALI PATOGENI

Situazione fitosanitaria al 21 febbraio 2025

Meteo

	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven
Bologna	 11° 0°	 11° 4°	 13° 5°	 11° 7°	 13° 7°	 12° 8°	 8° 6°	 11° 3°
Ravenna	 9° 1°	 11° 3°	 12° 6°	 11° 8°	 13° 7°	 12° 7°	 10° 7°	 10° 6°
Ferrara	 11° 0°	 12° 2°	 13° 5°	 12° 7°	 13° 8°	 13° 8°	 9° 7°	 11° 4°
Forlì-Cesena	 11° 1°	 13° 2°	 13° 6°	 12° 7°	 14° 7°	 13° 8°	 9° 6°	 11° 3°
Rimini	 9° 2°	 11° 4°	 11° 7°	 11° 7°	 12° 8°	 13° 8°	 11° 7°	 11° 6°
Modena	 11° 0°	 11° 3°	 13° 4°	 12° 7°	 13° 8°	 12° 8°	 8° 5°	 11° 3°

Perturbazione in arrivo per l'inizio della prossima settimana. Pioggia prevista fra lunedì e martedì e, con maggiore probabilità, mercoledì. Temperature minime vicino a 2-4°C nei primi giorni della settimana ma in rialzo successivamente fra 7-8°C. Massime previste intorno a 11-13°C.

Periodo mediamente importante dal punto di vista fitosanitario per le seguenti avversità:

Bolla del pesco

Ticchiolatura del melo

Pesco

Bolla del pesco

L'infezione può essere tanto più grave quanto la bagnatura è prolungata e la temperatura sia al di sopra di 5-7°C

Fino a quando non si sono differenziate le giovani foglie è sufficiente un periodo di nebbia prolungata per causare infezione in quanto il patogeno è a diretto contatto con i primi tessuti vegetali in differenziazione. Successivamente, è necessario l'effetto meccanico della pioggia per veicolare il patogeno sui nuovi germogli in allungamento.

Rischio infettivo in previsione di pioggia, nebbia o bagnatura prolungata: ALTO

Melo

Gemme ferme

Ticchiolatura

Maturazione delle prime ascospore: La maturazione delle ascospore è mediamente in anticipo di una settimana rispetto alla media. Leggermente più indietro la maturazione per le province di Bologna e Modena. **Si potrebbe prevedere un primo timido rilascio ascosporico con le piogge previste fra martedì e mercoledì prossimi nel Ferrarese e Ravennate che non creerà danno in quanto avviene non in presenza di tessuti verdi suscettibili.**

Rischio infettivo climatico: BASSO

Rischio infettivo epidemiologico: NULLO