

















































**SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Bollettino N°27 - MODELLI PREVISIONALI PATOGENI

Situazione fitosanitaria al 23 giugno 2026

Meteo

	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar
Bologna	 36° 23°	 34° 22°	 35° 22°	 36° 23°	 37° 23°	 37° 24°	 36° 23°	 33° 22°
Ravenna	 33° 24°	 33° 23°	 33° 22°	 34° 22°	 34° 23°	 35° 24°	 36° 24°	 33° 23°
Ferrara	 36° 24°	 34° 23°	 36° 23°	 36° 24°	 37° 23°	 38° 24°	 37° 24°	 34° 22°
Forlì- Cesena	 34° 23°	 33° 23°	 33° 23°	 34° 23°	 34° 23°	 36° 25°	 36° 24°	 33° 23°
Rimini	 31° 24°	 31° 23°	 31° 22°	 32° 23°	 31° 23°	 32° 25°	 33° 25°	 31° 23°
Modena	 36° 23°	 34° 22°	 36° 23°	 36° 23°	 37° 23°	 38° 24°	 36° 23°	 33° 22°

Periodo mediamente importante dal punto di vista fitosanitario per le seguenti avversità:

Peronospora vite

Maculatura bruna del pero

Glomerella del melo

Melo

Ticchiolatura

Potenziale ascosporico esaurito

Rischio infettivo solo in presenza di infezioni secondarie in campo

Glomerella del melo

Le infezioni sulle varietà sensibili (Gala, Golden, Pink Lady, Grany Smith) avvengono in base a condizioni climatiche caratterizzate da temperatura elevata (da 16°C a 34°C con valori ottimali da 26 a 30°C) e piogge con prolungato periodo di bagnatura.



Rischio Infettivo: NULLO



Legenda

Rischio BASSO: <40

Rischio MEDIO: >40 <60

Rischio ALTO: >60





Pero

Ticchiolatura

Potenziale ascosporico esaurito

Rischio infettivo solo in presenza di infezioni secondarie in campo

Maculatura bruna

Presenza sporadica su foglia e frutto

Bassa presenza di conidi di *S.vesicarium*

I conidi dopo una pioggia e con l'innalzarsi della temperatura media durante le interruzioni di bagnatura possono incrementarsi e causare infezione se entro i primi due-tre giorni intercettano ulteriori piogge o bagnature.

Monitoraggio aerobiologico conidi di *S.vesicarium*

Modena (Nonantola)

06-giu	13
07-giu	12
08-giu	12
09-giu	5
10-giu	8
11-giu	4
12-giu	1
13-giu	1
14-giu	2
15-giu	0

Bologna

07-giu	23
08-giu	30
09-giu	2
10-giu	2
11-giu	12
12-giu	4
13-giu	2
14-giu	2
15-giu	3
16-giu	0

Ferrara

07-giu	13
08-giu	0
09-giu	4
10-giu	5
11-giu	2
12-giu	3
13-giu	1
14-giu	2
15-giu	0

Ferrara (Fossalta)

05-giu	6
06-giu	1
07-giu	3
08-giu	3
09-giu	2
10-giu	1


11-giu	0
12-giu	0
13-giu	1
14-giu	0
15-giu	1
16-giu	3

Rischio infezione: BASSO


Rischio sporulazione: BASSO

Previsto un rischio di sporulazione e infezione in seguito alla pioggia prevista per il 2-3 luglio


Copparo 2026




San Bartolomeo 2026




Finale Emilia



Alfonsine 2026



Bomporto 2026



VITE

Peronospora (*Plasmopara viticola*)

Comparsa i sintomi di peronospora a Forlì, Modena, Reggio-Emilia, Ravenna ma infezioni di scarsa entità

Potenziale oosporico in esaurimento: dal 88 al 99%.

Graf 1. Presenza di zoospore sulla lettiera che potrebbero intercettare possibili piogge e infettare in presenza di tessuti vegetali suscettibili e popolazioni di oospore che sono già germinate



Graf 2. Presenza di oospore che hanno terminato la fase di germinazione

Graf 3. Presenza di oospore dal 90 al 100 della fase di germinazione e che potrebbero terminare la germinazione e intercettare le piogge per dare infezione nei prossimi 3-4 giorni.

Rischio infettivo: BASSO (per assenza di pioggia)


VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]

Sulle foglie (fraz.): data 23/06/2026



VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]

Germinate (fraz.): data 23/06/2026




Germinate (fraz.)

data 23/06/2026

0,00 fraz. - 0,01 fraz.
0,01 fraz. - 0,02 fraz.
0,02 fraz. - 0,03 fraz.
0,03 fraz. - 0,05 fraz.
0,05 fraz. - 0,06 fraz.
0,06 fraz. - 0,07 fraz.
0,07 fraz. - 0,08 fraz.
0,08 fraz. - 0,09 fraz.

VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]

In germinazione (90 - 100) (fraz.): data 23/06/2026



In germinazione (90 - 100) (fraz.)

data 23/06/2026

0,00 fraz. - 0,01 fraz.
0,01 fraz. - 0,02 fraz.
0,02 fraz. - 0,03 fraz.
0,03 fraz. - 0,05 fraz.
0,05 fraz. - 0,06 fraz.
0,06 fraz. - 0,07 fraz.
0,07 fraz. - 0,08 fraz.
0,08 fraz. - 0,09 fraz.

Oidio (*Uncinula necator*)

Comparsa di sintomi di oidio primario

Possibile inizio anche della fase epidemica conidica se persiste un clima asciutto per almeno due settimane. Le piogge in questa fase, al contrario, riducono il rischio di sviluppo epidemico.

Rischio sviluppo epidemico: ALTO

Patata & Pomodoro

Peronospora (Phytophthora infestans)

Soglia di pressione infettiva al di sopra della quale è raccomandata il ripristino della copertura fungicida:
2,56

Pressione infettiva: BASSA

Rischio infettivo: BASSO

POMODORO, *Peronospora del pomodoro* – potenziale infettivo [IPI]

Indice cumulato 7gg (n.): data 23/06/2026

