

















































SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Bollettino N°28 - MODELLI PREVISIONALI PATOGENI

Situazione fitosanitaria al 28 giugno 2026

Meteo

	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
Bologna	 37° 24°	 37° 24°	 35° 23°	 35° 19°	 27° 20°	 31° 20°	 32° 19°	 33° 21°
Ravenna	 35° 23°	 36° 24°	 35° 23°	 36° 21°	 27° 22°	 30° 21°	 30° 20°	 31° 21°
Ferrara	 37° 24°	 37° 24°	 36° 23°	 36° 21°	 29° 21°	 32° 21°	 32° 20°	 34° 21°
Forlì-Cesena	 36° 24°	 36° 25°	 35° 24°	 35° 21°	 26° 21°	 29° 20°	 29° 19°	 32° 21°
Rimini	 32° 24°	 33° 26°	 32° 25°	 33° 22°	 26° 22°	 28° 22°	 28° 21°	 29° 21°
Modena	 37° 24°	 36° 24°	 34° 23°	 35° 20°	 28° 20°	 32° 19°	 33° 19°	 34° 21°

Periodo mediamente importante dal punto di vista fitosanitario per le seguenti avversità:

Peronospora vite

Maculatura bruna del pero

Glomerella del melo

Peronospora pomodoro

Melo

Ticchiolatura

Potenziale ascosporico esaurito

Rischio infettivo solo in presenza di infezioni secondarie in campo



Glomerella del melo



Le infezioni sulle varietà sensibili (Gala, Golden, Pink Lady, Grany Smith) avvengono in base a condizioni climatiche caratterizzate da temperatura elevata (da 16°C a 34°C con valori ottimali da 26 a 30°C) e piogge con prolungato periodo di bagnatura.

Rischio Infettivo: BASSO

Legenda

- Rischio BASSO: <40
- Rischio MEDIO: >40 <60
- Rischio ALTO: >60





Pero

Ticchiolatura

Potenziale ascosporico esaurito

Rischio infettivo solo in presenza di infezioni secondarie in campo

Maculatura bruna

Presenza sporadica su foglia e frutto

Bassa presenza di conidi di *S.vesicarium*

I conidi dopo una pioggia e con l'innalzarsi della temperatura media durante le interruzioni di bagnatura possono incrementarsi e causare infezione se entro i primi due-tre giorni intercettano ulteriori piogge o bagnature.

Monitoraggio aerobiologico conidi di *S.vesicarium*

Modena (Nonantola)

15-giu	0
16-giu	4
17-giu	2
18-giu	0

19-giu	2
20-giu	1
21-giu	3
22-giu	1
23-giu	4
24-giu	2
25-giu	4

Bologna

13-giu	2
14-giu	2
15-giu	3
16-giu	0
17-giu	1
18-giu	4
19-giu	2
20-giu	1
21-giu	2
22-giu	3

Ferrara

13-giu	1
14-giu	2
15-giu	0
16-giu	4
17-giu	3
18-giu	1
19-giu	2
20-giu	3
21-giu	1


Ferrara (Fossalta)

15-giu	1
16-giu	3
17-giu	1
18-giu	4
19-giu	1
20-giu	4
21-giu	1
22-giu	0


Rischio infezione: MEDIO

Rischio sporulazione: MEDIO (dopo la pioggia prevista)


Previsto un rischio di sporulazione e infezione in seguito alla pioggia prevista per il 2-3 luglio




San Bartolomeo 2026




Copparo 2026



Alfonsine 2026





Bomporto 2026





VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]

Germinate (fraz.): data 28/06/2026



VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]


In germinazione (90 - 100) (fraz.): data 28/06/2026



Aree di possibili infezioni primarie di peronospora

VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]

Infezione (qtà) (fraz.): data 01/07/2026



Oidio (*Uncinula necator*)

Comparsa di sintomi di oidio primario

Possibile inizio anche della fase epidemica conidica se persiste un clima asciutto per almeno due settimane. Le piogge in questa fase, al contrario, riducono il rischio di sviluppo epidemico.

Rischio sviluppo epidemico: ALTO

Patata & Pomodoro

Peronospora (*Phytophthora infestans*)

Soglia di pressione infettiva al di sopra della quale è raccomandata il ripristino della copertura fungicida:
2,56

Pressione infettiva: BASSA

Rischio infettivo: BASSO

