
















































**SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Bollettino N°24 - MODELLI PREVISIONALI PATOGENI

Situazione fitosanitaria al 09 giugno 2026

Meteo

	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar
Bologna	 32° 20°	 31° 18°	 26° 14°	 28° 16°	 31° 18°	 31° 18°	 28° 18°	 29° 18°
Ravenna	 31° 19°	 31° 19°	 24° 16°	 26° 16°	 29° 18°	 29° 19°	 28° 19°	 27° 19°
Ferrara	 32° 20°	 29° 19°	 26° 16°	 28° 16°	 32° 18°	 31° 19°	 28° 18°	 29° 18°
Forlì-Cesena	 31° 21°	 31° 18°	 23° 15°	 26° 16°	 29° 18°	 29° 19°	 28° 18°	 28° 19°
Rimini	 28° 21°	 31° 19°	 23° 16°	 24° 17°	 26° 18°	 27° 20°	 26° 19°	 26° 19°
Modena	 32° 19°	 30° 18°	 26° 14°	 29° 16°	 32° 17°	 31° 18°	 29° 18°	 29° 18°

Periodo mediamente importante dal punto di vista fitosanitario per le seguenti avversità:

Peronospora vite

Maculatura bruna del pero

Glomerella del melo

Peronospora pomodoro

Melo

Ticchiolatura

Potenziale ascosporico esaurito

Rischio infettivo solo in presenza di infezioni secondarie in campo

Glomerella del melo

Le infezioni sulle varietà sensibili (Gala, Golden, Pink Lady, Grany Smith) avvengono in base a condizioni climatiche caratterizzate da temperatura elevata (da 16°C a 34°C con valori ottimali da 26 a 30°C) e piogge con prolungato periodo di bagnatura.



Rischio Infettivo: BASSO



Legenda

Rischio BASSO: <40

Rischio MEDIO: >40 <60

Rischio ALTO: >60





Rischio infettivo previsto: BASSO (ma suscettibile di modifiche in base alla intensità e durata della bagnatura prodotta)

Pero

Ticchiolatura

Potenziale ascosporico esaurito

Rischio infettivo solo in presenza di infezioni secondarie in campo

Maculatura bruna

Presenza sporadica su foglia e frutto

Incremento lieve di conidi di *S.vesicarium* con l'innalzarsi della temperatura media durante le interruzioni di bagnatura. Questi possono causare infezione se entro i primi due-tre giorni intercettano ulteriori piogge o bagnature.

Monitoraggio aerobiologico conidi di *S.vesicarium*

Modena

01-giu	nd
02-giu	nd
03-giu	nd
04-giu	nd
05-giu	nd
06-giu	13
07-giu	12
08-giu	1

Bologna

25-mag	0
26-mag	0
27-mag	5
28-mag	3
29-mag	1
30-mag	2
31-mag	6
01-giu	6

Ferrara

25-mag	0
26-mag	9
27-mag	9
28-mag	5
29-mag	3
30-mag	6
31-mag	6
01-giu	4

Ferrara (Fossalta)


22-mag	0
23-mag	0
24-mag	1
25-mag	0
26-mag	0
27-mag	1
28-mag	0
29-mag	1
30-mag	2
31-mag	0
01-giu	0
02-giu	0

Rischio infezione: MEDIO--BASSO


Rischio sporulazione: MEDIO-BASSO

Con il rialzo della temperatura e in funzione della durata della bagnatura si possono avere incrementi sostanziali dei conidi di *S.vesicarium*)


Bomporto 2026




Alfonsine 2026




Finale Emilia



San Bartolomeo 2026



Copparo 2026



VITE

Peronospora (*Plasmopara viticola*)

Comparsa i sintomi di peronospora a Forlì, Modena, Reggio-Emilia, Ravenna ma infezioni di scarsa entità

Graf 1. Presenza di zoospore sulla lettiera che potrebbero intercettare possibili piogge e infettare in presenza di tessuti vegetali suscettibili e popolazioni di oospore che sono già germinate



Graf 2. Presenza di oospore che hanno terminato la fase di germinazione

Graf 3. Presenza di oospore dal 90 al 100 della fase di germinazione e che potrebbero terminare la germinazione e intercettare le piogge per dare infezione nei prossimi 3-4 giorni.

Rischio infettivo: ALTO



VITE, Peronospora [DOWGRAPRI - © Horta S.r.l.]

Sulle foglie (fraz.): data 09/06/2026




VITE, Peronospora [DOWGRAPRI - © Horta S.r.l.]

Germinate (fraz.): data 09/06/2026



VITE, Peronospora [DOWGRAPRI - © Horta S.r.l.]

In germinazione (90 - 100) (fraz.): data 09/06/2026




Rischio infettivo MEDIO:

Aree di probabili infezioni in seguito alla pioggia prevista per 11 giugno

VITE, Peronospora [DOWGRAPRI - © Horta S.r.l.]

Infezione (qtà) (fraz.): data 11/06/2026



Oidio (*Uncinula necator*)

Comparsa di sintomi di oidio primario

Possibile inizio anche della fase epidemica conidica se persiste un clima asciutto per almeno due settimane. Le piogge in questa fase, al contrario, riducono il rischio di sviluppo epidemico.

Rischio sviluppo epidemico: MEDIO-ALTO

Patata & Pomodoro

Peronospora (Phytophthora infestans)

Soglia di pressione infettiva al di sopra della quale è raccomandata il ripristino della copertura fungicida: 2,56

Pressione infettiva: ALTA

Rischio infettivo: ALTO

POMODORO, Peronospora del pomodoro – potenziale infettivo [IPI]

Indice cumulato 7gg (n.): data 09/06/2026

