

COMUNICATO DEL 27 FEBBRAIO 2012

DRUPACEE

- **SUSINO europeo: gemme ferme- cino-giapponesi: gemma gonfia-rottura gemme**

BATTERIOSI e CORINEO: nelle varietà sensibili e negli impianti interessati è possibile intervenire nella fase di inizio rottura gemme impiegando prodotti rameici (attenzione: molti formulati commerciali non sono registrati per questa avversità).

FITOPLASMI: si ricorda che l'emissione anticipata di foglie e fiori è un sintomo della possibile presenza di fitoplasmi.

In questi casi si consiglia l'estirpazione delle piante infette.

COCCINIGLIA DI SAN JOSE': in presenza di infestazioni intervenire con Polisolfuro di Calcio o Olio minerale, o Olio minerale+Zolfo.

- **PESCO gemma gonfia**

BOLLA: la difesa dovrà essere eseguita in previsione di piogge o nebbie persistenti, nella **fase di rottura gemme a legno, con temperature prossime a 7-8°C**. Si consiglia l'utilizzo di dithianon, dodina, thiram, ziram o captano curando bene la bagnatura. Negli impianti in cui vi sia la presenza di batteriosi, ricorrere preferibilmente a prodotti rameici.

- **ALBICOCCO: gemma ferma**

BATTERIOSI e CORINEO: dalla fase di rottura gemme intervenire con prodotti rameici.

MELO E PERO

COLPO DI FUOCO BATTERICO: verificare la possibile presenza di infezioni. Gli organi colpiti andranno asportati; disinfettare le superfici di taglio.

Analoghe operazioni di asportazioni delle parti colpite sono consigliate anche in presenza di infezioni da **VALSA CERATOSPERMA** e altri cancri.

VITE

Durante le operazioni di potatura, si consiglia di eseguire tagli di rinnovo sulle piante che avessero manifestato alterazioni vascolari (es. **MAL DELL'ESCA**). Disinfettare le superfici di taglio.

BOSTRICO DELLA VITE: nei vigneti in cui si siano registrati attacchi, posizionare le fascine con tralci di potatura ove il fitofago andrà tendenzialmente a deporre le uova. Queste fascine dovranno essere rimosse e distrutte entro metà giugno.