

COMUNICATO DEL 12 MARZO 2012

La settimana è attesa calda e soleggiata; previsto l'arrivo di un peggioramento a fine periodo, con nuvolosità consistenti e possibili precipitazioni.

Attenzione: tutte le colture si trovano in una situazione di disparità territoriale; vengono pertanto indicati i primi interventi prefiorali, che andranno comunque adattati alla singola realtà aziendale.

Chi desiderasse inoltre ricorrere al metodo della confusione sessuale provveda ad ordinare i dispenser.

DRUPACEE

- **SUSINO:** Europeo: da rottura gemme a bottone verde Cino-giapponesi: da bottone verde a inizio bottone bianco

CANCRO BATTERICO DELLE DRUPACEE: dove ne sia stata accertata la presenza effettuare nella fase di ingrossamento-rottura gemme interventi con prodotti rameici.

FITOPLASMI: si ricorda che l'emissione anticipata di foglie e fiori è un sintomo della possibile presenza di fitoplasmi. In questi casi si consiglia l'estirpazione delle piante infette.

COCCINIGLIE: in presenza di infestazioni intervenire entro rottura gemme con Polisolfuro di Calcio o Olio bianco, o Polithiol. Per interventi a bottone verde utilizzare Olio bianco.

- **PESCO rottura gemme- inizio bottone rosa**

BOLLA: la difesa dovrà essere eseguita da questa fase e in previsione di piogge o nebbie persistenti con temperature prossime a 7-8°C. Si consiglia l'utilizzo di dithianon, dodina, thiram, ziram o captano curando bene la bagnatura. Negli impianti in cui vi sia la presenza di batteriosi, ricorrere preferibilmente a prodotti rameici.

COCCINIGLIE: in caso si rilevino le infestazioni ricorrere a interventi prefiorali a base di piriproxifen con l'aggiunta di un bagnante specifico o Olio bianco.

AFIDI: al superamento soglia (3% germogli infestati), nella fase di bottone rosa, intervenire con: acetamiprid, flonicamid, thiametoxam o imidacloprid. Questo ultimo andrà posizionato almeno 10 giorni prima della fioritura.

TRIPIDI: intervenire in prefioritura con lambdacialotrina, alfacipermetrina, acrinatrina, ciflutrin.

CIDIA MOLESTA: da questa settimana è possibile cominciare il posizionamento delle trappole per il monitoraggio degli adulti.

- **CILIEGIO: gemma gonfia**

CORINEO: dalla fase di rottura gemme intervenire con prodotti rameici.

COCCINIGLIE: in caso di presenza ricorrere a interventi a base di Polisolfuro di calcio o Olio bianco.

- **ALBICOCCO: bottoni rosa, inizio fioritura**

MONILIA: trattare da inizio fioritura con: *Bacillus subtilis*, tebuconazolo, fenbuconazolo, ciproconazolo, fludioxonili+ciprodinil o pyraclostrobin +boscalid.

MELO E PERO da gemma gonfia a rottura gemme

CANCRI RAMEALI: intervenire nella fase di rottura gemme-punte verdi con prodotti rameici, attivi anche nei confronti di **TICCHIOLATURA.**

COLPO DI FUOCO BATTERICO: asportare gli organi colpiti e disinfettare le superfici di taglio. Analoghe operazioni sono consigliate anche in presenza di infezioni da **VALSA CERATOSPERMA** e altri cancri.

COCCINIGLIE: in presenza di infestazioni intervenire con Polisolfuro di Calcio o Olio bianco a rottura gemme o Polithiol, al massimo entro gemma gonfia.

CIDIA MOLESTA: da questa settimana è possibile cominciare il posizionamento delle trappole per il monitoraggio degli adulti.

VITE - inizio pianto

Durante le operazioni di potatura, si consiglia di eseguire tagli di rinnovo sulle piante che avessero manifestato alterazioni vascolari (es. **MAL DELL'ESCA**). Disinfettare le superfici di taglio.

BOSTRICO DELLA VITE: nei vigneti in cui si siano registrati attacchi, posizionare le fascine con tralci di potatura ove il fitofago andrà tendenzialmente a deporre le uova. Queste fascine dovranno essere rimosse e distrutte entro metà giugno.