

COMUNICATO DEL 19 MARZO

Per la settimana sono previste giornate instabili, con annuvolamenti sparsi. Al momento non sono attese precipitazioni di rilievo.

DIVIETI DI TRATTAMENTI IN FIORITURA

Si rammenta il divieto di trattare durante la fioritura con insetticidi, acaricidi o prodotti dichiarati tossici per le api e gli insetti pronubi. In presenza di fioritura del cotico erboso, è obbligatorio procedere allo sfalcio dello stesso 48 ore prima del trattamento.

Attenzione: ordinare i dispenser per il metodo della confusione sessuale.

DRUPACEE

- **SUSINO: Europeo: da rottura gemme a bottone verde Cino-giapponesi: da bottone bianco a inizio fioritura**

MONILIA: con condizioni climatiche favorevoli (elevata umidità e bagnature prolungate) intervenire con: ciproconazolo, fenbuconazolo, pyraclostrobin+boscalid, fludioxonil+ciprodinil o *Bacillus subtilis*

FITOPLASMI: l'emissione anticipata di foglie e fiori è un possibile sintomo di fitoplasmii. Si consiglia l'estirpazione delle piante infette.

COCCINIGLIE: intervenire dove ancora possibile, entro bottone verde, con Olio bianco.

TENTREDINE: posizionare le trappole dalla fase di bottone bianco

- **PESCO da bottone rosa a fioritura**

SHARKA: controllare i pescheti durante la fioritura per evidenziare la presenza di sintomi, ben visibili sulle cultivar a fiore rosaceo. In caso di presenza, contattare i nostri uffici.

BOLLA: rinnovare la protezione in previsione di pioggia o nebbie prolungate con dithianon, dodina, thiram, ziram o captano. Con batteriosi, preferire prodotti rameici.

MONILIA: nella fase di fioritura e solo su cultivar sensibili intervenire con: tebuconazolo, fenbuconazolo, difenconazolo, ciproconazolo, fludioxinil+ciprodinil, pyraclostrobin+boscalid o *Bacillus subtilis*

COCCINIGLIE: se necessario intervenire nella fase prefiorale con piriproxifen.

AFIDI: al superamento soglia, nella fase di bottone rosa, intervenire con: acetamiprid, fluvalinate, thiametoxam oppure verso il solo afide verde anche clothianidin o flonicamid,

TRIPIDI: intervenire in prefioritura con lambdacialotrina, alfacipermetrina, acrinatrina, ciflutrin.

CIDIA MOLESTA: posizionare le trappole per il monitoraggio degli adulti.

- **CILIEGIO: da gemma gonfia a inizio rottura gemme**

CORINEO: dalla fase di rottura gemme intervenire con prodotti rameici.

COCCINIGLIE: se necessario intervenire con Polisolfuro di calcio o Olio bianco.

- **ALBICOCCO: fioritura**

MONILIA: trattare da inizio fioritura con: tebuconazolo, fenbuconazolo, ciproconazolo, fludioxonil+ciprodinil o pyraclostrobin +boscalid o *Bacillus subtilis*.

MELO da punte verdi a orecchiette di topo - PERO da gemma gonfia a rottura gemme

TICCHIOLATURA: intervenire nelle cvs sensibili con prodotti rameici, anticipando eventuali piogge.

COLPO DI FUOCO BATTERICO: asportare gli organi colpiti e disinfettare le superfici di taglio, operazioni consigliate anche in presenza di infezioni da **VALSA CERATOSPERMA** o altri cancri.

COCCINIGLIE: intervenire con Polisolfuro di Calcio o Olio bianco

EULIA e CIDIA MOLESTA: posizionare le trappole per il monitoraggio degli adulti.

VITE pianto

Eeguire tagli di rinnovo sulle piante con **MAL DELL'ESCA**. Disinfettare le superfici di taglio.

BOSTRICO DELLA VITE: nei vigneti con attacchi, posizionare le fascine trappola che dovranno essere rimosse e distrutte entro metà giugno.