

COMUNICATO DEL 26 MARZO

Per la settimana sono attese giornate soleggiate, senza previsioni di precipitazioni.

Per alcune avversità (es. ticchiolatura o bolla) vengono comunque mantenute le indicazioni di difesa; in questi casi risulta strategico posizionare gli interventi avvicinandosi a possibili piogge, in modo preventivo.

DIVIETI DI TRATTAMENTI IN FIORITURA

Si rammenta il divieto di trattare durante la fioritura con insetticidi, acaricidi o prodotti dichiarati tossici per le api e gli insetti pronubi. In presenza di fioritura del cotico erboso, è obbligatorio procedere allo sfalcio dello stesso 48 ore prima del trattamento.

DRUPACEE

MONILIA DELLE DRUPACEE: con condizioni climatiche favorevoli (elevata umidità o bagnature prolungate) intervenire con: IBE (verificare le registrazioni sulle singole colture), pyraclostrobin+boscalid, fludioxonil+ciprodinil o *Bacillus subtilis*

- **SUSINO: Europeo: da bottone bianco a inizio fioritura Cino-giapponese: da fioritura a caduta petali**

TENTREDINE: posizionare-controllare le trappole

CIDIA FUNEBRANA: da questa settimana è possibile iniziare l'installazione delle trappole

- **PESCO: fioritura**

SHARKA: controllare i pescheti durante la fioritura per evidenziare la presenza di sintomi, ben visibili sulle cultivar a fiore rosaceo. In caso di presenza, contattare i nostri uffici.

BOLLA: rinnovare la protezione in previsione di pioggia o nebbie prolungate con dithianon, dodina, thiram, ziram o captano.

CIDIA MOLESTA: si segnalano i primi adulti; posizionare le trappole per il monitoraggio dove non ancora fatto.

- **CILIEGIO: fioritura**
- **ALBICOCCO: caduta petali**

MELO orecchiette di topo primi bottoni rossi - PERO bottoni bianchi

TICCHIOLATURA: intervenire nelle cvs sensibili preferibilmente con ditiocarbammati, anticipando eventuali piogge. Su melo è consigliato l'utilizzo di Dithianon o prodotti rameici.

OIDIO DEL MELO: dalla fase prefiorale intervenire con Zolfo

COCCINIGLIA: in caso di necessità intervenire con con olio bianco o piriproxifen.

TENTREDINE: prime catture; controllare le trappole per programmare l'intervento post-fiorale

AFIDE GRIGIO DEL MELO: intervenire alla comparsa delle fondatrici con azadiractina, pirimetanil, fluvalinate o flonicamid

RICAMATORI: sulla generazione svernante è consigliato un intervento solo in caso di superamento soglia e di stretta necessità.

EULIA e CIDIA MOLESTA: si segnalano le prime catture; posizionare le trappole per il monitoraggio degli adulti.

VITE gemma cotonosa

COCCINIGLIE: in caso di necessità è possibile intervenire con Olio o Polithiol, quest'ultimo attivo anche nei confronti dell'eriofide dell'acariosi.

TIGNOLETTA: da questa settimana è possibile iniziare l'installazione delle trappole