

COMUNICATO DEL 2 APRILE

Da martedì sono attese precipitazioni sparse, anche con carattere temporalesco. La perturbazione potrà durare alcuni giorni. Le temperature sono previste in flessione rispetto ai valori registrati fino ad oggi.

DIVIETI DI TRATTAMENTI IN FIORITURA

Si rammenta il divieto di trattare durante la fioritura con insetticidi, acaricidi o prodotti dichiarati tossici per le api e gli insetti pronubi. In presenza di fioritura del cotico erboso, è obbligatorio procedere allo sfalcio dello stesso 48 ore prima del trattamento.

MELO da bottoni rossi a fioritura PERO fioritura

TICCHIOLATURA: su melo si consiglia di intervenire anticipando le piogge con Ditanon, Fluazinam, Propineb, Metiram. Aggiungere Zolfo per la protezione da **OIDIO**.

Su pero, in relazione alla sensibilità fenologica e alle attese perturbazioni, è consigliato ricorrere a prodotti utili anche verso **MARCIUMI CALICINI** come Fludioxonil+ciprodinil, Pyraclostrobin+Boscalid, Boscalid, Tebuconazolo, Captano o Iprodione. In caso di interventi posticipati rispetto alle piogge, su vegetazione non protetta, ricorrere a IBE.

COLPO DI FUOCO: da questa fase è possibile impiegare *Bacillus subtilis* o Bion

CARPOCAPSA: da fine fioritura installare le trappole per il monitoraggio e la confusione sessuale.

TENTREDINE: controllare le trappole per programmare l'intervento post-fiorale con Acetamiprid

EULIA e CIDIA MOLESTA: si rilevano le catture degli adulti.

DRUPACEE

MONILIA DELLE DRUPACEE: si raccomanda di rinnovare la protezione con: IBE, (verificare le registrazioni sulle singole colture) pyraclostrobin+boscalid, fludioxonil+ciprodinil o *Bacillus subtilis*

- **SUSINO: Europeo: fioritura Cino-giapponese: da caduta petali a inizio allegazione**

TENTREDINE: posizionare-controllare le trappole. Nelle cv. cino-giapponesi, se necessario, intervenire con Imidacloprid

AFIDI: da caduta petali è possibile intervenire con: pirimicarb, thiamteoxam, flonicamid, acetamiprid o imidacloprid. In caso di necessità verificare le registrazioni o le attività collaterali verso tentredine.

CIDIA FUNEBRANA: è atteso l'inizio del volo

- **PESCO: caduta petali-inizio allegazione**

BOLLA: in relazione alla pericolosità di infezione sui germogli e sui frutticini si consiglia di rinnovare la protezione in previsione delle piogge attese preferibilmente con dithianon, dodina, o captano.

CIDIA MOLESTA: continua il volo.

AFIDE VERDE: intervenire da caduta petali (soglia 3% su nettarine e 10% su pesche di germogli infestati) con: Imidacloprid, Acetamiprid, Flonicamid, Thiametoxam, Clothianidin, Pirimicarb o Spirotetramat.

TRIPIDI: intervenire a caduta petali dove ne sia stata verificata la presenza con Acrinatrina o Clorpirifos metile.

- **CILIEGIO: fioritura**
- **ALBICOCCO: scamiciatura**

OIDIO: intervenire dalla fase di scamiciatura con prodotti a base di zolfo

VITE gemma cotonosa-apertura gemme

Soprattutto sulle barbatelle in cui sia iniziato il germogliamento, è possibile intervenire per **ERIOFIDE dell'ACARIOSI** con Fenazaquin o Exitiazox+Fenazaquin e verso **TRIPIDI:** con spinosad. Per i vigneti in produzione sarà necessario attendere una fase più avanzata.

TIGNOLETTA: si segnalano le primissime catture di adulti.