

COMUNICATO DEL 23 APRILE

Si prevede il passaggio di una perturbazione con possibili precipitazioni; a partire da mercoledì generale miglioramento con innalzamento delle temperature.

MELO e PERO allegagione

TICCHIOLATURA: si attende l'evasione delle piogge infettanti. Rinnovare la protezione, intervenendo anticipando le precipitazioni previste, con prodotti di copertura.

Su melo aggiungere Zolfo per la protezione da **OIDIO**.

MACULATURA: non si segnala l'inizio del volo conidico.

CARPOCAPSA: presenza di adulti; gli interventi ovicidi saranno da posizionarsi dall'inizio della prossima settimana ricorrendo preferibilmente a coragen.

EULIA e CIDIA MOLESTA: gli interventi larvicidi sono consigliati solo in caso di stretta necessità.

AFIDE GRIGIO DEL MELO: in presenza di reinfestazioni, intervenire con: Fluvalinate, Azadiractina, Pirimicarb, Spirotetramat o Flonicamid

DRUPACEE

- ***SUSINO: ingrossamento frutto***

CIDIA FUNEBRANA: prosegue il volo. Gli interventi in prima generazione sono ammessi solo con scarsa allegagione; i trattamenti a base di coragen sono da eseguirsi in settimana, mentre si rimanda alla prossima settimana per gli interventi ad azione larvicida.

- ***PESCO: ingrossamento frutto***

CIDIA MOLESTA: gli interventi larvicidi sono indicati solo dove strettamente necessario.

ANARSIA: installare le trappole

AFIDE VERDE: intervenire (soglia 3% su nettarine e 10% su pesche di germogli infestati) con: Imidacloprid, Acetamiprid, Flonicamid, Thiametoxam, Clothianidin, Pirimicarb o Spirotetramat.

- ***CILIEGIO: scamicia tura-ingrossamento frutto***

EULIA, CHEMIATOBIA: in caso di necessità intervenire con *Bacillus thuringiensis*

AFIDI: con il 3% di organi infestati o in aree ad alto rischio, intervenire con Imidacloprid, Acetamiprid, Thiametoxam o Piretro.

- ***ALBICOCCO: ingrossamento frutto***

OIDIO: intervenire con prodotti a base di zolfo

VITE da germogliamento a prime foglie distese

Negli impianti con germogliamento in fase più avanzata, si consiglia di intervenire, preventivamente alle piogge, con un prodotto di copertura per la protezione da **PERONOSPORA** ; aggiungere Zolfo contro eventuali infezioni di **OIDIO**.

ERIOFIDE dell' ACARIOSI: dove si rilevino infestazioni intervenire con Fenazaquin o Exitiazox+Fenazaquin

TRIPIDI: in presenza di forti infestazioni è possibile eseguire un trattamento con spinosad.

TIGNOLETTA: prosegue il volo degli adulti.