

COMUNICATO DEL 25 GIUGNO 2012

Settimana prevista calda e soleggiata con parziali velature del cielo.

Attenzione: per tutti gli interventi rispettare i tempi di carenza dei prodotti impiegati.

PERO e MELO

MACULATURA BRUNA: mantenere una idonea protezione verificando la possibile presenza di infezioni in campo e l'eventuale ricorso a irrigazione soprachiuma. Modulare gli interventi in considerazione della situazione aziendale, ricorrendo a prodotti specifici solo nelle situazioni più problematiche.

TICCHIOLETTA: in presenza di infezioni mantenere un turno ridotto; dove possibile ricorrere a prodotti per maculatura, a duplice attività. In assenza di infezioni è possibile allungare i turni, anticipando sempre possibili piogge. Su melo aggiungere Zolfo per la protezione da **OIDIO**.

COLPO DI FUOCO: verificare le possibili infezioni in campo; procedere alla immediata pulizia e all'asportazione di eventuali fiori secondari.

RAGNETTO (BRUSONE): sulle varietà sensibili con temperature superiori a 28°C, programmare un intervento con: etoxazole, clorfentazina, exitiazox, fenaziquin, piridaben, exitiazox+fenaziquin o tebufenpirad.

CARPOCAPSA: è iniziato il nuovo volo. Gli interventi larvicidi, salvo casi particolari, saranno da posizionarsi dalla prossima settimana.

PSILLA: in caso di necessità, ricorrere preferibilmente a lavaggi.

CIDIA MOLESTA e EULIA: prosegue il volo; presenza di larve. Intervenire con: bacillus thuringiensis, spinosad, indoxacarb, o emamectina. In presenza di sola molesta sono utilizzabili anche: fosmet, clorpirifos etile, thiacloprid, acrinatrina o etofenprox.

COCCINIGLIA DI SAN JOSE': in caso di necessità intervenire con clorpirifos metile o spirotetramat

VITE

BOTRITE: sulle varietà sensibili si consiglia di intervenire entro la fase di chiusura grappolo con: fluazinam, fenexamid, boscalid, pirimetanil, fludioxonil+ciprodinil.

OIDIO: intervenire con prodotti a base di zolfo, verificando la possibile presenza di sintomi in campo.

PERONOSPORA: la situazione in campo è buona; rinnovare la protezione intervenendo prima di una pioggia o in presenza di infezioni sporulanti con prodotti di copertura.

MAL DELL'ESCA: contrassegnare le piante colpite

TIGNOLETTA: Presenza di larve. Dove necessario intervenire preferibilmente con prodotti ad azione larvicida.

SCAFOIDEO: gli interventi andranno posizionati nel periodo compreso tra il 15 e il 30 giugno ricorrendo a prodotti a base di: buprofezin, clorpirifos etile, clorpirifos metile, etofenprox e thiametoxam.

DRUPACEE

MONILIA: in prospettiva della raccolta, intervenire con: IBE (verificare le registrazioni e le carenze sulle singole colture) pyraclostrobin+boscalid, fludioxonil+ciprodinil o bacillus subtilis

- **SUSINO**

CIDIA FUNEBRANA: presenza di adulti e larve. A superamento soglia (10 adulti/trapp/sett) intervenire con: rinaxipir, thiacloprid, fosmet (TC 14 gg), spinosad, etofenprox, emamectina (TC 7 gg).

- **PESCO**

CIDIA MOLESTA: presenza di larve. Dove necessario intervenire con: bacillus thuringiensis (TC 3 gg), spinosad, etofenprox, acrinatrina, emamectina o indoxacarb, (TC 7 gg) fosmet o thiacloprid (TC 14 gg), clorpirifos etile (TC 30 gg).

ANARSIA: il nuovo volo è iniziato o è imminente

- **ALBICOCCO**

ANARSIA: il nuovo volo è iniziato o è imminente.

RACCOLTA DEI CONTENITORI VUOTI E BONIFICATI

Informazioni in merito alle sedi Cooperative operative e alle date, sono pubblicate sul sito internet www.fitosanitario.mo.it