

**COMUNICATO DEL 6 AGOSTO 2012**

La situazione meteorologica non prevede cambiamenti rispetto alla settimana appena conclusa; permarranno pertanto condizioni di alta pressione con temperature elevate.

**Attenzione: per tutti gli interventi rispettare i tempi di carenza dei prodotti impiegati.**

**POMACEE**

**MACULATURA BRUNA:** la situazione in campo è buona; mantenere la protezione riconducendo la scelta del prodotto da impiegarsi alla possibile presenza di infezioni e all'eventuale irrigazione soprachioma.

In presenza di **TICCHIOLATURA** ricorrere a prodotti a duplice attività. Su melo aggiungere Zolfo per la protezione da **OIDIO**.

**COLPO DI FUOCO:** verificare le infezioni in campo; procedere alla pulizia e all'asportazione degli organi colpiti.

**CARPOCAPSA:** il terzo volo è iniziato o è imminente. Gli interventi larvicidi saranno da posizionarsi dalla prossima settimana.

**PSILLA:** la presenza è disforme. Dove necessario intervenire con lavaggi.

**CIDIA MOLESTA:** intervenire con: *bacillus thuringiensis* (TC 3 gg), spinosad, indoxacarb, emamectina o etofenprox (TC 7 gg), fosmet o thiacloprid (TC 14 gg).

**EULIA E RICAMATORI:** le popolazioni permangono contenute. Salvo casi di particolare rilevanza non si consigliano trattamenti specifici.

**VITE invaiatura**

**BOTRITE:** sulle varietà sensibili, od in presenza di lesioni e spaccature, intervenire con: pirimetanil, fluazinam, boscalid, fenexamid oppure ciprodinil + fludioxonil.

**OIDIO:** intervenire con zolfo, verificando la possibile presenza di sintomi in campo.

**PERONOSPORA:** in queste condizioni non sono previsti interventi specifici.

**TIGNOLETTA:** prosegue il volo che risulta complessivamente contenuto. Verificare la presenza in campo e in caso di necessità intervenire con: *bacillus thuringiensis*, emamectina o spinosad.

**CICALINA VERDE:** si segnala qualche reinfestazione. Con attacchi consistenti è consigliato un trattamento con Thiametoxam, Flufenoxuron o Indoxacarb.

**MAL DELL'ESCA:** contrassegnare le piante sintomatiche per poter eseguire tagli di risanamento mirati. Disinfettare le superfici di taglio e gli attrezzi impiegati.

**FLAVESCENZA DORATA:** la pressione della malattia è in aumento. Asportare le parti sintomatiche od estirpare le piante più gravemente colpite.

**DISSECCAMENTO DEL RACHIDE:** si segnalano alcuni casi riconducibili a questa fisiopatia.

**DRUPACEE**

**MONILIA:** le condizioni di campo sono buone e non si consigliano interventi specifici.

- **CIDIA FUNEBRANA DEL SUSINO:** intervenire dove sia superata la soglia con: fosmet (TC 14 gg), spinosad, etofenprox o emamectina (TC 7 gg).
- **CIDIA MOLESTA e ANARSIA del PESCO:** dove necessario rinnovare la protezione con: *bacillus thuringiensis* (TC 3 gg), spinosad, etofenprox, emamectina (TC 7 gg). Per sola c molesta sono utilizzabili anche: acrinatrina o indoxacarb, (TC 7 gg) fosmet o thiacloprid (TC 14 gg), clorpirifos etile (TC 30 gg).
- **PSEUDOMONAS DELL'ALBICOCCO:** eseguire la potatura estiva di post-raccolta finalizzata a contenere gli attacchi di *Pseudomonas syringae*