

COMUNICATO DEL 13 AGOSTO 2012

Attenzione: per tutti gli interventi rispettare i tempi di carenza dei prodotti impiegati.

Ad un inizio settimana caratterizzato da clima gradevole, si susseguirà un periodo con nuovi picchi di calore. Non sono previste precipitazioni.

POMACEE

MACULATURA BRUNA: la situazione in campo è buona; mantenere la protezione riconducendo la scelta del prodotto da impiegarsi alla possibile presenza di infezioni e all'eventuale irrigazione soprachioma.

In presenza di **TICCHIOLOLATURA** ricorrere a prodotti a duplice attività. Su melo aggiungere Zolfo per la protezione da **OIDIO**.

COLPO DI FUOCO: verificare le infezioni in campo; procedere alla pulizia e all'asportazione degli organi colpiti.

CARPOCAPSA: il terzo volo prosegue; posizionare gli interventi larvicidi (fosmet, emamectina o spinosad) in settimana, valutando la pressione aziendale e il tempo di carenza del prodotto impiegato

PSILLA: la presenza è disforme. Dove necessario intervenire con lavaggi.

CIDIA MOLESTA: intervenire con: *bacillus thuringiensis* (TC 3 gg), spinosad, indoxacarb, emamectina o etofenprox (TC 7 gg), fosmet o thiacloprid (TC 14 gg).

EULIA E RICAMATORI: le popolazioni permangono contenute. Salvo casi di particolare rilevanza non si consigliano trattamenti specifici.

VITE invaiatura

BOTRITE: sulle varietà sensibili, od in presenza di lesioni e spaccature, intervenire con: pirimetanil, fluazinam, boscalid, fenexamid oppure ciprodinil + fludioxonil.

OIDIO: intervenire con zolfo, verificando la possibile presenza di sintomi in campo.

PERONOSPORA: in queste condizioni non sono previsti interventi specifici.

TIGNOLETTA: verificare la presenza in campo e in caso di necessità intervenire con: *bacillus thuringiensis*, emamectina o spinosad.

CICALINA VERDE: si segnala qualche reinfestazione. Con attacchi consistenti è consigliato un trattamento con Thiametoxam, Flufenoxuron o Indoxacarb.

MAL DELL'ESCA: contrassegnare le piante sintomatiche per poter eseguire tagli di risanamento mirati. Disinfettare le superfici di taglio e gli attrezzi impiegati.

FLAVESCENZA DORATA: la pressione della malattia è in aumento. Asportare le parti sintomatiche od estirpare le piante più gravemente colpite.

DISSECCAMENTO DEL RACHIDE: si segnalano alcuni casi riconducibili a questa fisiopatia.

DRUPACEE

MONILIA: le condizioni di campo sono buone e non si consigliano interventi specifici.

- **CIDIA FUNEBRANA DEL SUSINO:** intervenire dove sia superata la soglia con: fosmet (TC 14 gg), spinosad, etofenprox o emamectina (TC 7 gg).
- **CIDIA MOLESTA e ANARSIA del PESCO:** dove necessario rinnovare la protezione con: *bacillus thuringiensis* (TC 3 gg), spinosad, etofenprox, emamectina (TC 7 gg). Per sola c molesta sono utilizzabili anche: acrinatrina o indoxacarb, (TC 7 gg) fosmet o thiacloprid (TC 14 gg).