

COMUNICATO DEL 10 SETTEMBRE 2012

Attenzione: per tutti gli interventi rispettare i tempi di carenza dei prodotti impiegati.

La settimana potrebbe risultare parzialmente instabile con alcuni locali temporali.

VITE

BOTRITE e MARCIUME ACIDO: verificare lo stato dei grappoli, per la possibile presenza di lesioni o per l'insorgenza di marciumi. Modulare gli eventuali interventi, sia fitosanitari che agronomici (potature verdi), sulla base dell'epoca di vendemmia.

TIGNOLETTA: in alcuni contesti si è registrato il quarto volo. Non si prevedono interventi.

MAL DELL'ESCA: contrassegnare le piante sintomatiche per poter eseguire tagli di risanamento mirati. Disinfettare le superfici di taglio e gli attrezzi impiegati.

FLAVESCENZA DORATA: asportare le parti sintomatiche od estirpare le piante più gravemente colpite

POMACEE (pero e melo)

CARPOCAPSA: si rilevano alcuni danni, in genere contenuti. Dove necessario (es. melo), è possibile eseguire un intervento con prodotti a ridotto intervallo di sicurezza (es. emamectina o spinosad).

Preferire formulati validi anche per **CIDIA MOLESTA** e altri carpofagi.

MOSCA DELLA FRUTTA (melo/kaki): in alcuni contesti aziendali si rilevano infestazioni. In caso di necessità intervenire con Etofenprox

TICCHIOLATURA e MACULATURA BRUNA e: la situazione di campo è buona. E' comunque possibile eseguire un intervento con prodotti a duplice valenza per contenere il rischio di attacchi sulle varietà più tardive.

COLPO DI FUOCO: verificare le infezioni in campo, soprattutto a seguito di eventi temporaleschi; procedere all'asportazione degli organi colpiti.