



SERVIZIO FITOSANITARIO
IL RESPONSABILE
STEFANO BONCOMPAGNI

AFE
Via Bologna, 714 – Ferrara
afe@pec.afe.it

APOCONERPO Soc. Coop. Agricola
Via Tosarelli, 155
47020 Villanova di Castenaso (BO)
apoconerpo@legalmail.it

Servizi Territoriali Caccia e Pesca di Piacenza,
Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna.
Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Servizi Centrali interessati della D. G.
Agricoltura della Regione Emilia-Romagna
Indirizzi PEC

Oggetto: Reg. UE n. 1698/05; n. 1305/13; n. 1308/2013; n. 1234/07, LLRR n. 28/98 e 28/99 - Deroga valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un intervento a base di thiacloprid, per il controllo delle infestazioni di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle varietà di pero raccolte dopo Max Red Bartlett (William rosso)

A seguito delle richieste pervenute in data 30 luglio e 1 agosto u.s. (prot. PG/2019/0622156 e PG/2019/0627136), si concede una deroga, valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un intervento a base di thiacloprid, per il controllo delle infestazioni di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle varietà di pero raccolte dopo Max Red Bartlett (William rosso).

Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni:

- Permane una preoccupante e diffusa presenza di adulti, ovature e neanidi di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) in molti pereti della regione;
- L'impiego di thiacloprid, già autorizzato precedentemente per le varietà di pero raccolte fino a Max Red Bartlett (William rosso) compreso, si rende necessario anche per le varietà raccolte successivamente a tale cv;
- La s.a. thiacloprid ha mostrato una discreta efficacia nel controllo delle forme giovanili della cimice asiatica e potrà essere inserita nelle strategie di difesa anche per il contemporaneo controllo delle popolazioni di Carpocapsa (*Cydia pomonella*).

Si ricorda comunque che l'impiego di Thiacloprid, ferme restando tutte le condizioni applicative di etichetta, va a sostituire un intervento con un piretroide e che l'impiego di questa classe di insetticidi in questa fase fenologica del pero può avere gravi ripercussioni negative sul contenimento delle popolazioni di psilla (*Psylla pyri*).

Cordiali saluti

Dr. Stefano Boncompagni
(firmato digitalmente)

Copia analogica a stampa, tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) identificato dal numero di protocollo indicato.

LA/FM/MBa REG 41 pero cimice asiatica thiacloprid 2
Via A. da Formigine, 3 Tel. 051.527.8111
40128 Bologna Fax 051.353.809

Email: omp1@regione.emilia-romagna.it
PEC: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it
<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario>