CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE MODENA

Comunicato del 31 Marzo 2014

Inizio settimana con giornate soleggiate o con parziali annuvolamenti. Peggioramento atteso a fine periodo.
SI RICORDA CHE NEL PERIODO DI FIORITURA E' FATTO DIVIETO DI UTILIZZARE INSETTICIDI, ACARICIDI O PRODOTTI IDENTIFICATI TOSSICI PER LE API.

MELO da mazzetti visibili a bottone rosso PERO fioritura

TICCHIOLATURA: prosegue il rilascio ascosporico.
Rinnovare la copertura in previsione della perturbazione attesa a fine settimana.
Gli interventi andranno fatti preventivamente a una pioggia preferibilmente con ditianon, captano, metiram o propineb. Su melo è impiegabile anche fluazinam. Su pero anche ziram.
Nelle situazioni più critiche sono impiegabili anche miscele di prodotti di copertura con IBE
MARCIUME CALCINO: nelle situazioni predisponenti (es. forte inoculo, varietà solitamente colpite, caduta petali..) si consiglia un intervento anticipando le piogge con pyraclostrobin+ciprodinil, fluazinam, tebuconazolo, bacillus amyloliquiefaciens, boscalid o iprodione
TENTREDINE: programmare l'intervento a caduta petali con il superamento soglia (20 adulti per trappola o 10% di corimbi colpiti) con acetamiprid
AFIDE GRIGIO DEL MELO: intervenire alla comparsa delle fondatrici con azadiractina o flonicamid

DRUPACEE

MONILIA: con condizioni predisponenti, verificate le singole registrazioni, intervenire con: *Bacillus subtilis*, pyraclostrobin+boscalid, fludioxonil+ciprodinil o IBE.

- **SUSINO EUROPEO: fioritura– CINO-GIAPPONESE: caduta petali-scamiciatura**

TENTREDINE: intervenire a caduta petali con imidacloprid, che ha azione collaterale anche verso gli afidi
CIDIA FUNEBRANA: è iniziato il volo. Procedere all'installazione dei dispenser della confusione sessuale e le trappole

- **PESCO: caduta petali**

BOLLA: nelle situazioni più critiche rinnovare la difesa utilizzando dithianon, dodina, thiram, ziram o captano curando bene la bagnatura.
CIDIA MOLESTA: continua il volo. Salvo casi di particolare gravità non si consigliano interventi. Si ricorda di procedere all'installazione della confusione sessuale.
AFIDE VERDE: intervenire a completa caduta petali (superamento del 3% su nettarine e 10% su pesche di germogli infestati) con: imidacloprid, thiametoxam, acetamiprid, clothianidin o movento.
TRIPIDI: se necessario, a completa caduta petali, intervenire su nettarine poste in aree a rischio e dove è stata verificata la presenza con clorpirifos metile o formentanate

- **ALBICOCCO: allegagione-scamiciatura**
- **CILIEGIO: fioritura**

VITE da gemma cotonosa a inizio germogliamento

MAL DELL'ESCA: durante la potatura, si consiglia di eseguire tagli di rinnovo sulle piante colpite e di disinfettare le superfici di taglio. In questa fase risulta utile eseguire un trattamento con prodotti registrati a base di Tricoderma. Questo intervento andrà ripetuto per più annate per esplicare al meglio la sua attività di tipo preventivo.
ESCORIOSI: nei vigneti solitamente colpiti e in fase fenologica più avanzata intervenire con mancozeb, metiram o pyraclostrobin+metiram
ACARIOSI: in questa fase è possibile verificare la presenza di eriofidi che possono limitare il normale accrescimento dei germogli.
TIGNOLETTA: il volo è iniziato o imminente. Installare le trappole per il monitoraggio e la confusione sessuale

PER **ULTERIORI INFORMAZIONI** RIGUARDANTI ALTRI PARASSITI NON CONSIDERATI NEL PRESENTE COMUNICATO TELEFONARE AL 059.243107 DURANTE L'ORARIO DI UFFICIO DALLE 8 ALLE 14 DI TUTTI I GIORNI (COMPRESO IL SABATO).