

REVYSION® PERO

FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DELLA MACULATURA BRUNA DEL PERO

Sospensione concentrata (SC)

FRAC: G1

REVYSION® PERO

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Mefentrifluconazolo g 7,12 (75 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso. P261: Evitare di respirare i vapori. P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti protettivi. P303+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P311: In caso di irritazione o eruzione della pelle, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

Officina di produzione:

BASF Espanola S.L., Tarragona, Spagna

Officina di ri-etichettatura:

Ita.Fer.T Snc - Canale (CN), Italia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. 17866 del 21.05.2021

Contenuto netto: 1- 5 Litri

Partita n.

© Marchio registrato BASF

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti adatti durante le operazioni di miscelazione e caricamento del prodotto.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Lasciar trascorrere almeno 24 ore per il rientro.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici:

- **Per le applicazioni precoci (fino allo stadio di bottoni fiorali) mantenere:**

- una fascia di sicurezza non trattata di **20 metri** dai corpi idrici superficiali;
- una fascia di sicurezza non trattata di **10 metri** dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del **75%**;
- una fascia di sicurezza non trattata di **5 metri** dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del **90%**;
- nessuna fascia di rispetto se si utilizzano dispositivi che riducono la deriva del **95%**;

- **Per le applicazioni tardive (da inizio fioritura) mantenere:**

- una fascia di sicurezza non trattata di **10 metri** dai corpi idrici superficiali;
- una fascia di sicurezza non trattata di **5 metri** dai corpi idrici superficiali in combinazione a dispositivi che riducano la deriva del **50%**;
- nessuna fascia di rispetto se si utilizzano dispositivi che riducono la deriva del **90%**.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

REVYSION PERO è un fungicida contenente la sostanza attiva mefentrifluconazolo, un innovativo triazolo che inibisce la biosintesi dell'ergosterolo, dotato di mobilità translaminare e sistemica e con attività preventiva e curativa. Il prodotto viene assorbito velocemente dalla pianta agendo rapidamente all'interno della stessa.

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

Impiegare volumi d'acqua che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.

Pero: contro Maculatura bruna (*Stemphylium* spp.), intervenire preventivamente alla dose di **1.8 - 2.0 litri per ettaro** da chiusura gemme fino a maturazione avanzata dei frutti. Rispettare un massimo di **2 trattamenti** a stagione e un **intervallo minimo tra le applicazioni di 7 giorni**.

Rispettare il numero massimo di trattamenti a stagione e l'intervallo tra le applicazioni sopra riportate.

È possibile **utilizzare il prodotto con volumi d'acqua** pari a 200-2000 litri per ettaro, in funzione dello stadio di sviluppo della coltura e del tipo di attrezzatura disponibile per l'applicazione in campo, rispettando le dosi massime per ettaro consentite.

Si consiglia di usare **REVYSION PERO** nei periodi critici di sviluppo della malattia, nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda l'alternanza di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

Attenersi sempre alle linee guida FRAC per l'applicazione degli inibitori della biosintesi dell'ergosterolo.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà circa. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua fino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire bene l'attrezzatura con acqua.

Avvertenza - Durante le operazioni di miscelazione e carico utilizzare guanti e tuta standard; durante l'applicazione utilizzare tuta standard.

FITOTOSSICITÀ

REVYSION PERO, applicato secondo le indicazioni riportate in questa etichetta, non ha mai causato danni alle diverse cultivar per saggiate fino ad oggi. Tuttavia, su varietà nuove e/o in caso di miscela con altri prodotti, si raccomanda di fare saggi preliminari su una piccola superficie, prima di estendere l'applicazione a tutto il campo.

COMPATIBILITÀ

REVYSION PERO è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione. Tuttavia, in caso di miscela con altri prodotti, si raccomanda di eseguire sempre saggi preliminari di miscibilità.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta delle pere.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21.05.2021

Con validità dal 21.05.2021 al 13.07.2021