

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>CRITTOGAME</b>					
<b>Cancro della corteccia</b> ( <i>Cryphonectria parasitica</i> )	<u>Interventi agronomici</u> eliminazione delle branche disseccate				
	<u>Interventi chimici</u> interventi localizzati sulle parti colpite	Prodotti rameici	(*)		(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
<b>Mal dell'inchiostro</b> ( <i>Phytophthora cambivora</i> )	<u>Interventi agronomici</u> - evitare i ristagni idrici - eliminare i primi centri di infezione - isolare l'area infetta dalle zone limitrofe				
	<u>Interventi chimici</u> interventi localizzati sulle piante colpite nelle prime fasi di sviluppo dell'avversità	Prodotti rameici	(*)		(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
<b>Fersa o seccume</b> ( <i>Mycosphaerella maculiformis</i> )	<u>Interventi agronomici</u> eliminare e distruggere le parti disseccate				
<b>FITOFAGI</b>					
<b>Tortrice precoce</b> ( <i>Pammene fasciana</i> )	<u>Interventi chimici</u> non ammessi				
<b>Tortrice intermedia</b> ( <i>Cydia fagiglandana</i> )	<u>Interventi agronomici</u> - distruzione dei frutti prematuramente caduti - raccolta e immediata distruzione del bacato	Nematodi entomopatogeni			
<b>Tortrice tardiva</b> ( <i>Cydia splendana</i> )	<u>Interventi agronomici</u> - distruzione dei frutti prematuramente caduti - raccolta e immediata distruzione del bacato	Nematodi entomopatogeni			
<b>Balanino</b> ( <i>Curculio elephas</i> )	<u>Interventi agronomici</u> - distruzione dei frutti prematuramente caduti - raccolta e immediata distruzione del bacato				
<b>Cinipide del castagno</b> ( <i>Dryocosmus kuriphilus</i> )	<u>Interventi agronomici</u> evitare il taglio autunnale delle galle per non danneggiare gli eventuali parassitoidi indigeni				
	<u>Interventi chimici</u> non ammessi				