

Controllo integrato delle infestanti di ERBA MEDICA

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | NOTE |
|----------------|---------------------------------|--|--|
| Pre-semina | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate (1) | (1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree |
| Post-emergenza | Cuscuta | Propizamide (2) | (2) Impiegabile solo per il contenimento della Cuscuta con interventi localizzati che, annualmente e complessivamente, non potranno superare il 50% dell'intera superficie |
| | Composite | Metribuzin (3) | (3) Non ammesso il primo anno di impianto. Ammesso sul 50% della superficie oppure ad anni alterni |
| | Dicotiledoni | Imazamox Piridate Tifensulfuron Bentazone (4) | (4) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su sorgo, soia, medica |
| | | | |
| | Graminacee | Quizalofop etile isomero D (5) Quizalofop-p-etile (5) Propaquizafop Clethodim | (5) Ammesso al massimo 1 intervento all'anno |

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero di ha ammissibili}$ è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.