

Comunicato del 23 giugno 2014

La settimana è attesa complessivamente instabile. Si potranno verificare temporali alternati a giornate soleggiate, con velature più o meno intense.

Attenzione: tutti gli interventi consigliati sono da intendersi verificata la situazione aziendale, l'eventuale superamento soglia e il rispetto dei tempi di carenza

VITE

PERONOSPORA: mantenere una adeguata protezione soprattutto nei vigneti in cui si sia rilevata la presenza di infezioni.

Aggiungere zolfo o prodotti specifici per la contemporanea protezione da **OIDIO**.

SCAFOIDEO: se non ancora fatto, intervenire preferibilmente con: clorpirifos etile, clorpirifos metile, etofenprox o thiametoxam

In agricoltura biologica utilizzare: piretrine o piretrine+PBO

BOTRITE: si consiglia di eseguire un trattamento ricorrendo a: *aereobasidium pullulans*, *bacillus amyloliquefaciens* o *bacillus subtilis*, bicarbonato di potassio, fluazinam, pirimetanil, fludioxonil+ciprodinil, fenexamid, boscalid, fluopiram o fenpirazamine

TIGNOLETTA: presenza di adulti, uova e larve. I trattamenti ovo-larvicidi saranno da eseguirsi con la massima tempestività. Preferire da questa settimana interventi larvicidi a base di: *bacillus thuringiensis*, spinosad o emamectina.

RAGNETTO GIALLO: a superamento della soglia (30-45% foglie con forme mobili presenti) intervenire con: clofentezine, abamectina, exitiazox, tebufenpirad, pyridaben o etoxazole.

COCCINIGLIA: in caso di necessità intervenire con clorantprilprole, buprofezin, clorpirifos metile o thiametoxam.

MELO e PERO

MACULATURA BRUNA: mantenere adeguata protezione in relazione al periodo perturbato con: iprodione, tiram, ziram, captano, pentiopirad, pyraclostrobin+boscalid, fludioxonil+ciprodinil, fluazinam, o tebuconazolo.

TICCHIOLATURA: con infezioni primarie e per il rischio di infezioni secondarie mantenere adeguata copertura sfruttando i prodotti a duplice attività utilizzati per la difesa da maculatura.

OIDIO MELO: rinnovare la protezione ricorrendo preferibilmente a zolfo

COLPO DI FUOCO: controllare la situazione in campo specie in presenza di seconde fioriture e di infezioni su cui eseguire immediata pulizia.

CARPOCAPSA: presenza di adulti e prime uova. Programmare per la prossima settimana interventi con prodotti larvicidi.

PSILLA: la diffusione è molto disforme; verificare la situazione in campo e ricorrere a eventuali interventi preferibilmente con olio minerale. In presenza di melata intervenire con lavaggi.

MIRIDI: in aumento la presenza di adulti e di frutti deformi. Dove necessario sfruttare l'attività di altri insetticidi con attività collaterale.

COCCINIGLIA: con forti infestazioni è possibile intervenire con clorpirifos metile, fosmet o spirotetramat.

AFIDI: si segnalano diversi casi di re infestazione. Intervenire con spirotetramat o altri prodotti registrati per la singola avversità

DRUPACEE

MONILIA: nelle aziende con colture e varietà prossime alla raccolta, con condizioni predisponenti, intervenire con *Bacillus subtilis*, pyraclostrobin+boscalid, fludioxonil+ciprodinil, fenexamide o IBE (verificare le singole registrazioni)

• CILIEGIO

DROSOPHILA SUZUKII: in caso di necessità intervenire con spinetoram o dimetoato oppure sfruttare l'attività di fosmet (attenzione alla possibile fitotossicità), spinosad o deltametrina da posizionarsi per altre avversità e che hanno attività anche verso *D.suzukii*.

MOSCA: controllare le trappole. In caso di necessità intervenire con: fosmet (attenzione alla possibile fitotossicità), acetamiprid, thiametoxam, etofenprox o spinosad in esca

AFIDI: in aree a elevato rischio o con oltre il 3% di organi infestati intervenire con imidacloprid, acetamiprid, thiametoxam o piretrine pure.

• SUSINO

CIDIA FUNEBRANA: presenza di adulti, uova e larve. Mantenere adeguata protezione, verificato il superamento soglia con: emamectina, thiacloprid, fosmet, etofenprox o spinosad

• PESCO

CIDIA MOLESTA: al superamento della soglia sono consigliati interventi larvicidi con: thiacloprid, spinosad, etofenprox o emamectina

• PESCO e ALBICOCCO

OIDIO: in caso di necessità intervenire con zolfo. In condizioni di particolare gravità è possibile ricorrere a prodotti specifici.

ANARSIA: sostituire fondi e feromoni per il prossimo volo atteso a giorni.