

SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Bollettino N° 13 - MODELLI PREVISIONALI PATOGENI

Situazione fitosanitaria al 5 aprile 2023

Meteo

| | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
|--------------|--|---|---|---|--|---|---|---|
| Bologna |  11° 0° |  15° 3° |  16° 5° |  16° 5° |  18° 6° |  18° 7° |  19° 7° |  21° 8° |
| Ravenna |  10° 0° |  13° 1° |  15° 7° |  15° 6° |  16° 8° |  16° 7° |  18° 8° |  18° 9° |
| Ferrara |  12° -1° |  15° 1° |  17° 4° |  17° 4° |  18° 6° |  19° 7° |  20° 7° |  21° 8° |
| Forlì-Cesena |  10° -1° |  14° 2° |  17° 5° |  15° 5° |  17° 6° |  17° 7° |  19° 7° |  20° 9° |
| Rimini |  9° 3° |  12° 3° |  16° 7° |  13° 7° |  14° 7° |  14° 8° |  17° 9° |  17° 9° |
| Modena |  13° 1° |  16° 3° |  16° 6° |  17° 6° |  19° 7° |  19° 8° |  19° 8° |  21° 9° |

Piogge previste per il fine settimana a partire da venerdì. Temperature massime di 15-17°C e minime di 4-7°C, inferiori alla media del periodo.

Periodo mediamente importante dal punto di vista fitosanitario per le seguenti avversità:

Ticchiolatura melo e pero

Peronospora cipolla

Nerume delle drupacee

Maculatura rossa albicocco

Septoria del grano

Maculatura rossa delle drupacee

Oidio Vite

Albicocco

scamicatura

Nerume

Condizioni per la sporulazione ancora non ottimale. Le infezioni possono verificarsi in condizioni termiche da 10 a 30°C (optimum di 20-25°C), e bagnature superiori a 12 ore. Alto rischio sporulazione in caso di bagnature prolungate e nebbie persistenti

Rischio infettivo: BASSO

Maculatura rossa

Raggiunte le condizioni per il rilascio delle ascospore di *Apiognomonina erythrostoma* agente della maculatura rossa dell'albicocco. Eventuali piogge devono considerarsi infettanti.

A partire dalla fase di scamicatura rischio infettivo in caso di pioggia: MEDIO-BASSO

Pesco

Caduta petali - allegagione

Nerume

Condizioni per la sporulazione ancora non ottimale. Le infezioni possono verificarsi in condizioni termiche da 10 a 30°C (optimum di 20-25°C), e bagnature superiori a 12 ore. Alto rischio sporulazione in caso di bagnature prolungate e nebbie persistenti

Rischio infettivo: BASSO

Cancri rameali *Phomopsis amygdali*

Temperatura per questa settimana non limitante. La gravità della sporulazione di *P. amygdali* è in funzione della bagnatura fogliare. Tanto più prolungata quanto più abbondante è la sporulazione.

Rischio di sporulazione in caso di pioggia: BASSO

Melo

fioritura

Ticchiolatura

Ascospore rilevate nella pioggia del 2-3 aprile

CAP Ravenna: 106 ascospore

CFMORE: 23 ascospore

Maturazione delle prime ascospore: **60-70%** delle ascospore mature per le province di Ravenna (prossima al mare) e Ferrara prossimo alla costa. **30-40%** delle ascospore mature mediamente per la provincia di Bologna e Modena.

5-12 %: Percentuale di ascospore disponibili al momento per essere rilasciate in caso di pioggia

Rischio infettivo in presenza di pioggia: MEDIO-ALTO

Elaborazione su dati reali dell'infezione del 2-3 aprile

Infezioni Fusignano

| Infezione | Pioggia | bagnatura (h) | T. med (°C) | Gravità | fine incubazione |
|-------------|---------|---------------|-------------|---------|------------------|
| 15 marzo | 8,5 | 15 | 10,3 | Leggera | 31/3 – 4/4 |
| 20 marzo | 10,7 | 33 | 10,9 | Grave | 4/4 - 9/4 |
| 26-27aprile | 12,3 | 13 | 8,4 | Nulla | - |
| 2-3 aprile | 16,7 | 21 | 8,8 | Media | 18/4 – 24/4 |

Infezioni S.Alberto

| Infezione | Pioggia | bagnatura (h) | T. med (°C) | gravità | Incubazione |
|-------------|---------|---------------|-------------|---------|-------------|
| 15 marzo | 0,6 | 9 | 10,3 | nulla | |
| 19-20 marzo | 9 | 35 | 10,8 | Grave | 4/4 - 9/4 |
| 26-27aprile | 10,4 | 16 | 9 | Leggera | 12/4 – 17/4 |
| 2-3 aprile | - | | | | |

Infezioni San Bartolomeo

| Infezione | Pioggia | bagnatura (h) | T. med (°C) | Gravità | Incubazione |
|-----------|---------|---------------|-------------|---------|-------------|
|-----------|---------|---------------|-------------|---------|-------------|

| | | | | | |
|-------------|------|----|------|---------|-------------|
| 15 marzo | 6 | 17 | 8,8 | leggera | 31/3 – 4/4 |
| 20 marzo | 13,4 | 32 | 11,2 | Grave | 4/4 - 9/4 |
| 26-27aprile | 7 | 16 | 8,4 | Leggera | 12/4 – 17/4 |
| 2-3 aprile | 2,3 | 19 | 8,8 | Leggera | 18/4 – 24/4 |

Infezioni Malborghetto

| Infezione | Pioggia | bagnatura (h) | T. med (°C) | gravità | Incubazione |
|-------------|---------|---------------|-------------|---------|-------------|
| 15 marzo | 2,6 | 8 | 10,5 | nulla | |
| 20 marzo | 5,1 | 17 | 11 | leggera | 4/4 - 9/4 |
| 26-27aprile | 8,8 | 17 | 8,6 | leggera | 12/4 – 17/4 |
| 2-3 aprile | 1,2 | 24 | 10,9 | Media | 18/4 – 24/4 |

Infezioni Malalbergo

| Infezione | Pioggia | bagnatura (h) | T. med (°C) | Gravità | Incubazione |
|-------------|---------|---------------|-------------|---------|-------------|
| 15 marzo | 2,2 | 6 | 11,3 | nulla | |
| 20 marzo | 10,1 | 31 | 11,3 | Grave | 4/4 - 9/4 |
| 26-27aprile | 7,2 | 16 | 8,6 | Leggera | 12/4 – 17/4 |
| 2-3 aprile | 7,7 | 25 | 10.1 | Media | 18/4 – 24/4 |

Irrigazione strategica

L'irrigazione strategica è una tecnica che permette durante la stagione vegetativa in periodi con cielo sereno e assenza di nuvolosità di indurre un rilascio forzato delle ascospore mature presenti, attraverso una irrigazione della lettiera fogliare di impianti di melo. L'irrigazione deve essere eseguita nelle ore più calde (11-13-14) 2 mm/ora per due ore intervallate da 0,5-1 ora.

E' necessario garantire che la vegetazione si asciughi per 8 ore prima della eventuale pioggia prevista.

La tecnica è già stata sperimentata nei tre anni passati con buoni risultati su melo

Pero

Fioritura

Ticchiolatura.

Rilascio ascosporico del 2-3 aprile

CAP Ravenna: 4 ascospore

CFMORE: 39 ascospore

La maggior parte (circa il 60%) del potenziale di inoculo di *V. pyrina* viene rilasciato nel periodo della fioritura

RISCHIO INFETTIVO per le prossime piogge ALTO

Maculatura bruna

Rilascio ascosporico di *Pleospora allii*.

Prevedere durante la potatura di asportare i rami dell'anno precedente colpiti da infezioni.

Nelle situazioni di forte presenza della malattia nell'anno precedente va valutata la possibilità di eseguire la lavorazione del cotico erboso

Stemphylium vesicarium

Nessuna cattura

La temperatura è ancora troppo bassa

Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*)

Le infezioni fiorali di colpo di fuoco batterico avvengono per la contemporanea presenza di tre fattori:

- la presenza di fiori aperti (tanto più alta la quantità di fiori aperti, maggiore il rischio)
- Il potenziale di sviluppo del batterio (influenzato dalla temperatura)
- La pioggia per veicolare il batterio all'interno degli organi fiorali.

La temperatura media non è ancora ottimale (15,5°C) per lo sviluppo di *Erwinia amylovora*

Rischio infettivo attuale in presenza di fiori aperti: BASSO

NOCE

Inizio germogliamento

Batteriosi del noce: Rischio infettivo BASSO

ACTINIDIA


Germogliamento

PSA

Potenziale di raddoppiamento batterico in aumento in Romagna.

Rischio infettivo in presenza di pioggia: Nullo <0,2; Basso (0,2-0,4); Medio (0,4 – 0,6); Elevato >0,6

Rischio infettivo: NULLO



VITE

inizio germogliamento

Peronospora

Termine della latenza delle oospore di *Plasmopara viticola*. Le piogge del fine settimana devono considerarsi le prime piogge preparatorie in grado di fare germinare le prime coorti di oospore coetanee.


Le famiglie di oospore in fase di germinazione più avanzata vanno dal 75-90% di germinazione nelle aree costiere.

Mediamente siamo in anticipo di 10 giorni rispetto all'anno passato.

Rischio infettivo: NULLO

VITE, Peronospora [DOWGRAPRI – © Horta S.r.l.]

In germinazione (75 - 90) (fraz.): data 06/04/2023



Oidio

Il potenziale di inoculo ascosporico va dal 18 al 27% di maturazione nella pedecollina.

Con le prossime piogge possono originarsi infezioni di oidio primarie. Il rilascio ascosporico e le conseguenti infezioni prendono avvio con piogge > 2,5 mm e temperatura >10°C.

Rischio infettivo attuale BASSO.

Cipolla

Autunnale: 5-6 foglie

Primaverile: 1-2 foglie

Botrite

Condizioni ottimali per le infezioni sono 7 ore di bagnatura a 15-20°C. Infezioni gravi avvengono con bagnature prolungate fino a 24 ore e T fra 9 e 26°C.

Rischio infettivo BASSO

Peronospora

Segnalata la comparsa dei primi sintomi di peronospora

Suscettibilità fenologica avviene allo stadio di 4-5° foglia

Le spore si producono di notte da 4 a 25°C (Temperatura ottimale 13°C) e alta UR. Le spore vengono rilasciate durante il giorno e rimangono vitali per almeno 4 giorni. Germinano da 7 a 16°C in presenza di acqua libera.

Rischio infettivo in presenza di pioggia: MEDIO

Aglio

4-5 foglie vere

Ruggine

Le condizioni climatiche ottimali per la germinazione delle spore di ruggine (16°C) in un range da 12 a 21°C.

Rischio infettivo attuale: NULLO

Frumento

Levata

Ruggine gialla

Condizioni per l'infezione: prolungata bagnatura e Temperature ottimali di 12-20°C. Nulla sotto 8°C e sopra 23°. La pressione infettiva è in crescita nelle aree costiere delle provincie di Ravenna e Ferrara

Pressione infettiva attuale: MEDIA

Septoria

Segnalati primi sintomi sulle foglie basali fino a quart'ultima foglia.

Si ricorda che i trattamenti fungicidi con prodotti chimici di sintesi in fase di accostamento non sono posizionati correttamente per il contenimento della malattia. In assenza di modelli previsionali, il momento migliore per l'intervento è dopo la terza pioggia infettante a partire dall'accostamento e in previsione della quarta. In alternativa intervenire alla fine della levata. Al momento le piogge appena trascorse sono da considerarsi il secondo-terzo evento infettivo. A partire da questa settimana settimana e in previsione di pioggia il rischio infettivo sarebbe concreto.

Mediamente dalla fase di accostamento vi sono stati tre eventi piovosi infettivi.

Pressione infettiva MEDIA-ALTA

Oidio

Pressione infettiva MEDIA