

Comunicato del 21 luglio 2014

Settimana complessivamente instabile e con piogge sparse anche a carattere temporalesco.

**Attenzione: tutti gli interventi consigliati sono da intendersi verificata la situazione aziendale, l'eventuale superamento soglia e il rispetto dei tempi di carenza**

### ***VITE-inizio invaiatura varietà precoci***

**PERONOSPORA:** mantenere una adeguata protezione soprattutto nei vigneti in cui si sia rilevata la presenza di infezioni.

Aggiungere zolfo per la contemporanea protezione da **OIDIO**.

**BOTRITE:** le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia. Programmare le operazioni e gli interventi di difesa.

**FLAVESCENZA DORATA e MAL DELL'ESCA:** in aumento le piante sintomatiche. Procedere tempestivamente all'asportazione degli organi colpiti. Si ricorda di eseguire il secondo trattamento obbligatorio contro **SCAFOIDEO** entro il 31 luglio.

Se necessario sfruttare l'attività del trattamento su altri fitofagi come **CICALINA VERDE, COCCINIGLIA O METCALFA**

**TIGNOLETTA:** atteso l'inizio del volo della terza generazione

### ***POMACEE-ingrossamento frutto-raccolta***

**MACULATURA BRUNA:** mantenere adeguata protezione anticipando irrigazioni e possibili temporali con: prodotti di copertura o specifici. Ricorrere a prodotti bivalenti, in presenza di infezioni di **TICCHIOLATURA**

**OIDIO MELO:** rinnovare la protezione ricorrendo preferibilmente a zolfo

**COLPO DI FUOCO:** controllare la situazione in campo. Asportare tempestivamente le seconde fioriture ed ogni eventuale organo infetto.

**CARPOCAPSA:** il volo è complessivamente scarso ed in esaurimento. Dove necessario, verificato il superamento soglia intervenire con virus della granulosi, emamectina, fosmet, spinosad o clorpirifos etile.

**MIRIDI e CIMICI:** presenza di adulti e di frutti deformi in aumento. Dove necessario sfruttare l'attività collaterale di altri insetticidi.

**COCCINIGLIA:** con forti infestazioni è possibile intervenire con clorpirifos metile, fosmet o spirotetramat.

**AFIDI:** si segnalano diversi casi di reinfestazione. Intervenire con spirotetramat o altri prodotti registrati per la singola avversità.

### ***DRUPACEE-raccolta***

**MONILIA:** nelle aziende con colture e varietà prossime alla raccolta, con condizioni predisponenti, intervenire con *Bacillus subtilis*, pyraclostrobin+boscalid, fludioxonil+ciprodinil, fenexamide o IBE (verificare le singole registrazioni)

**DROSOPHILA SUZUKII:** monitorare la situazione in campo per rilevare possibili attacchi su albicocco, susino e pesco.

- ***SUSINO***

**CIDIA FUNEBRANA:** presenza di adulti e inizio ovideposizione. Verificato il superamento soglia, compatibilmente con i tempi di carenza, programmare per i prossimi giorni un intervento con prodotti ovicidi.

- ***PESCO***

**CIDIA MOLESTA e ANARSIA:** presenza di larve. Al superamento della soglia è possibile intervenire con prodotti larvicidi, verificato il tempo di carenza e le possibili attività verso altri fitofagi