

**Comunicato del 4 agosto 2014**

La settimana è attesa complessivamente in miglioramento. Possibili rovesci accompagnati da nuvolosità di intensità variabile.

**Attenzione: tutti gli interventi consigliati sono da intendersi verificata la situazione aziendale, l'eventuale superamento soglia e il rispetto dei tempi di carenza**

### **VITE invaiatura**

**BOTRITE:** le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia. Si consiglia un intervento con: fluazinam, pirimetanil, fludioxonil+ciprodinil, fenexamid, boscalid, fluopiram, fenpirazamine, *aereobasidium pullulans*, bicarbonato di potassio, *bacillus amyloliquefaciens* o *bacillus subtilis*,

**PERONOSPORA:** mantenere una adeguata protezione soprattutto nei vigneti in cui si sia rilevata la presenza di infezioni. Aggiungere zolfo per la contemporanea protezione da **OIDIO**.

**FLAVESCENZA DORATA e MAL DELL'ESCA:** in aumento le piante sintomatiche. Procedere tempestivamente all'asportazione degli organi colpiti.

**DISSECCAMENTO DEL RACHIDE E SCOTTATURE:** si segnalano diversi casi

**CICALINA VERDE e COCCINI GLIA:** in caso di infestazioni di particolare intensità, valutare un intervento specifico.

**TIGNOLETTA:** in caso di necessità, verificata la presenza delle uova (superamento soglia 5% di grappoli infestati), programmare un intervento larvicida con: bacillus thuringiensis, spinosad, emamectina o clorantraniliprole

### **POMACEE ingrossamento frutto-raccolta**

**MACULATURA BRUNA:** la situazione rilevata in campo è buona. Mantenere adeguata protezione con prodotti di copertura o specifici. Ricorrere a prodotti bivalenti, in presenza di infezioni di **TICCHIOLATURA**

**COLPO DI FUOCO:** controllare la situazione in campo specie nelle zone colpite da temporali violenti o grandine. Asportare tempestivamente ogni eventuale organo infetto.

**CARPOCAPSA:** sostituire i fondi e i feromoni; il nuovo volo è atteso a breve

**MIRIDI e CIMICI:** presenza di adulti e di frutti deformi in aumento. Dove necessario sfruttare l'attività collaterale di altri insetticidi.

**AFIDI:** si segnalano diversi casi di reinfestazione. Intervenire con spirotetramat o altri prodotti registrati per la singola avversità.

### **DRUPACEE raccolta**

**MONILIA:** con condizioni predisponenti, intervenire con prodotti specifici (verificare le singole registrazioni)

**DROSOPHILA SUZUKII:** monitorare la situazione in campo per rilevare possibili attacchi su susino e pesco.

- **SUSINO**

**CIDIA FUNEBRANA:** presenza di adulti, uova e larve. Verificato il superamento soglia, compatibilmente con i tempi di carenza e dove non si sia eseguito un trattamento ovidica, intervenire con etofenprox, fosmet, thiacloprid, spinosad o emamectina

- **PESCO**

**CIDIA MOLESTA e ANARSIA:** presenza di larve. Al superamento della soglia è possibile intervenire con prodotti larvicidi, verificato il tempo di carenza e le possibili attività verso altri fitofagi.