

Comunicato del 23 marzo 2015

La settimana è attesa fortemente instabile. Si alterneranno giornate coperte e piovose a giornate soleggiate o parzialmente soleggiate.

DIVIETO DI TRATTAMENTI IN FIORITURA

(Decreto R.E.R. n° 130 del 4/3/1991)

Durante il periodo della fioritura delle colture è vietata l'esecuzione di trattamenti insetticidi, acaricidi o con prodotti tossici per le api. In presenza di fioritura del cotico erboso, è obbligatorio procedere allo sfalcio dello stesso 48 ore prima del trattamento.

MELO E PERO rottura gemme-punte verdi, orecchiette di topo

TICCHIOLATURA: con le piogge del 21 e 22 marzo è stato rilevato l'avvio del volo ascosporico su melo: sebbene la recettività sia estremamente variabile si consiglia di mantenere opportuna protezione ricorrendo a prodotti rameici. Su melo, con il germogliamento più avanzato, sono possibili anche interventi con dithianon, captano, propineb, metiram o pentiopirad.

Porre la massima attenzione anche su pero, in considerazione dell'inoculo e dell'atteso volo ascosporico.

COCCINIGLIA: intervenire in caso di presenza con olio minerale.

COLPO DI FUOCO BATTERICO e CANCRI RAMEALI: gli interventi eseguiti nei confronti di ticchiolatura con prodotti rameici risultano validi anche per il contenimento di infezioni da cancri.

EULIA: da questa settimana si consiglia l'installazione delle trappole per il monitoraggio degli adulti

DRUPACEE

MONILIA: nella fase di fioritura, di elevata sensibilità alle infezioni, in caso di condizioni favorevoli, si consiglia un intervento con: *bacillus subtilis*, IBE (verificare le singole registrazioni), fludioxonil+ciprodinil,pyraclostrobin+boscalid oppure trifloxistrobin+tebuconazolo.

COCCINIGLIE: intervenire con Olio bianco o programmare un intervento prefiorale con buprofezin o piriproxfen

- **SUSINO** europeo: da rottura gemme a bottone visibile - cino-giapponesi: da bottone bianco a inizio fioritura

TENTREDINE: dalla fase di bottone bianco installare le trappole cromotropiche bianche

BATTERIOSI e CORINEO: nelle varietà sensibili e negli impianti interessati è possibile intervenire nella fase di inizio rottura-ingrossamento gemme impiegando prodotti rameici.

FITOPLASMI: si ricorda che l'emissione anticipata di foglie e fiori è un sintomo della possibile presenza di fitoplasmii. In questi casi si consiglia l'estirpazione delle piante infette.

- **PESCO** da punte verdi a inizio fioritura

BOLLA: in previsione di pioggia, laddove l'intervento precedente si ritenga dilavato o esaurito, si consiglia di intervenire con dodina, captano, thiram, ziram.

CIDIA MOLESTA: l'impupamento è in stadio di forte avanzamento. Si consiglia di installare le trappole per il monitoraggio degli adulti e programmare il posizionamento della confusione sessuale.

SHARKA: la presenza di anomalie del colore dei fiori, riconducibili alla presenza della virosi, sono ben evidenti in fase di fioritura. Si consiglia pertanto di verificarla situazione fitosanitaria negli impianti.

- **ALBICOCCO:** fioritura
- **CILIEGIO:** da gemma gonfia a rottura gemme

CORINEO: nella fase di rottura gemme, in caso di necessità, intervenire con prodotti rameici.

VITE

MAL DELL'ESCA: dalla fase del pianto, a potatura completata, programmare la possibile esecuzione di un trattamento con prodotti registrati a base di trichoderma.

COCCINIGLIA: intervenire in caso di presenza con olio minerale o polithiol. Tali prodotti non vanno mescolati con trichoderma.