

### Comunicato del 30 marzo 2015

Si attende una settimana caratterizzata da alta pressione con giornate soleggiate e progressivamente calde. Probabile peggioramento con piogge anche temporalesche nel fine settimana.

#### **DIVIETO DI TRATTAMENTI IN FIORITURA**

(Decreto R.E.R. n° 130 del 4/3/1991)

Durante il periodo della fioritura delle colture è vietata l'esecuzione di trattamenti insetticidi, acaricidi o con prodotti tossici per le api. In presenza di fioritura del cotico erboso, è obbligatorio procedere allo sfalcio dello stesso 48 ore prima del trattamento.

#### **MELO E PERO rottura gemme-punte verdi, orecchiette di topo**

**TICCHIOLATURA:** prosegue il volo ascosporico su melo. Mantenere opportuna protezione anticipando le prossime piogge, ricorrendo a prodotti rameici. In caso di necessità sono possibili anche interventi con dithianon, captano, propineb, metiram o pentiopirad.

Porre la massima attenzione anche su pero, in considerazione dell'inoculo e dell'atteso volo ascosporico.

**COCCINIGLIA:** intervenire in caso di presenza con olio minerale.

**COLPO DI FUOCO BATTERICO e CANCRI RAMEALI:** gli interventi eseguiti nei confronti di ticchiolatura con prodotti rameici risultano validi anche per il contenimento di infezioni da cancri.

**EULIA:** si consiglia l'installazione delle trappole per il monitoraggio degli adulti

**AFIDE GRIGIO DEL MELO:** alla comparsa delle fondatrici intervenire con azadiractina o flonicamid

#### **DRUPACEE**

**MONILIA:** nella fase di fioritura, di elevata sensibilità alle infezioni, in caso di condizioni favorevoli, si consiglia un intervento con: *bacillus subtilis*, IBE (verificare le singole registrazioni), fludioxonil+ciprodinil,pyraclostrobin+boscalid oppure trifloxistrobin+tebuconazolo.

**COCCINIGLIE:** intervenire con Olio bianco o programmare un intervento prefiorale con buprofezin o piriproxifen

- **SUSINO** europeo: bottone visibile - cino-giapponesi: fioritura

**TENTREDINE:** dalla fase di bottone bianco installare le trappole cromotropiche bianche

- **PESCO** fioritura

**BOLLA:** in previsione di pioggia, laddove l'intervento precedente si ritenga dilavato o esaurito, si consiglia di intervenire con dodina, captano, thiram, ziram.

**CIDIA MOLESTA:** l'impupamento è in stadio di forte avanzamento. Si consiglia di installare le trappole per il monitoraggio degli adulti e programmare il posizionamento della confusione sessuale.

**SHARKA:** la presenza di anomalie del colore dei fiori, riconducibili alla presenza della virosi, sono ben evidenti in fase di fioritura. Si consiglia pertanto di verificare la situazione fitosanitaria negli impianti.

- **ALBICOCCO:** fioritura-fine fioritura
- **CILIEGIO:** da rottura gemme a bottone verde

#### **VITE**

**MAL DELL'ESCA:** dalla fase del pianto, a potatura completata, programmare la possibile esecuzione di un trattamento con prodotti registrati a base di trichoderma.

**COCCINIGLIA:** intervenire in caso di presenza con olio minerale o polithiol. Tali prodotti non vanno mescolati con trichoderma.