

Comunicato del 13 aprile 2015

Inizio settimana caldo e soleggiato con parziali annuvolamenti.
Peggioramento con possibili piovvaschi a fine periodo.

DIVIETO DI TRATTAMENTI IN FIORITURA

(Decreto R.E.R. n° 130 del 4/3/1991)

Durante il periodo della fioritura delle colture è vietata l'esecuzione di trattamenti insetticidi, acaricidi o con prodotti tossici per le api. In presenza di fioritura del cotico erboso, è obbligatorio procedere allo sfalcio dello stesso 48 ore prima del trattamento.

MELO E PERO da inizio fioritura a caduta petali

TICCHIOLATURA-MARCIUMI: si raccomanda di mantenere opportuna protezione anticipando le prossime piogge, ricorrendo a dithianon, dodina, captano, propineb, metiram, fluazinam o pentiopirad o in casi di particolare gravità, a prodotti specifici.

Le possibili infezioni della pioggia del 4 aprile sono in evasione in settimana

CARPOCAPSA: da questa settimana installare le trappole per il monitoraggio degli adulti e i dispenser per la confusione sessuale

TENTREDINE: verificare il superamento soglia (20 adulti/trappola d a inizio volo o 10% corimbi infestati) e programmare un intervento da completa caduta petali con acetamiprid

DRUPACEE

MONILIA: in caso di condizioni favorevoli sulle colture ancora in fioritura, si consiglia di rinnovare la protezione con: *bacillus subtilis*, IBE (verificare le singole registrazioni), fludioxonil+ciprodinil, pyraclostrobin+boscalid oppure trifloxistrobin+tebuconazolo

- **SUSINO** da caduta petali a inizio allegazione

TENTREDINE: intervenire da caduta petali con imidacloprid

CIDIA FUNEBRANA: si consiglia di installare le trappole per il monitoraggio degli adulti

- **PESCO** allegazione

CIDIA MOLESTA: il volo è iniziato ma complessivamente è contenuto.

AFIDE VERDE: intervenire al superamento del 3% su nettarine e 10% su pesche di germogli infestati con: spirotetramat, imidacloprid, acetamiprid o clothianidin

TRIPIDI: in caso di danni rilevati la passata annata, intervenire con clorpirifos metile, spinosad o formentanate

- **ALBICOCCO:** allegazione-scamicatura e **CILIEGIO:** da fioritura a caduta petali

APIOGNOMONIA: la fase di scamatura e di allungamento dei germogli è di massima suscettibilità alla quale corrisponde anche la maturazione dei periteci.

Si raccomanda di porre la massima attenzione in previsione di pioggia e di intervenire con prodotti rameici o in caso di infezioni gravi rilevate lo scorso anno, preferire fenbuconazolo

VITE

OIDIO: negli impianti in fase di germogliamento più avanzato e che abbiano avuto problemi nell'anno precedente è possibile intervenire con prodotti a base di zolfo

MAL DELL'ESCA: dalla fase del pianto, a potatura completata, programmare la possibile esecuzione di un trattamento con prodotti registrati a base di trichoderma

TIGNOLETTA: il volo è imminente. Installare le trappole per il monitoraggio degli adulti.

FRUMENTO TENERO E DURO

SEPTORIA: come indicato nel Bollettino Straordinario emesso il 31 marzo dal SFR relativo a difesa del frumento dalla septoria, a partire dall' 8 aprile e al raggiungimento della fase fenologica ottimale (BBCH39-ultima foglia), è possibile intervenire sulle varietà suscettibili con bixafen+tebuconazolo, tebuconazolo, tetraconazolo, ciproconazolo, procloraz, azoxistrobin, trifloxistrobin, picostrobin o piraclostrobin.