

### Comunicato del 20 aprile 2015

La settimana è attesa complessivamente caratterizzata dal bel tempo.  
Previsti peggioramenti a fine periodo con possibilità di precipitazioni.

#### **DIVIETO DI TRATTAMENTI IN FIORITURA**

(Decreto R.E.R. n° 130 del 4/3/1991)

*Durante il periodo della fioritura delle colture è vietata l'esecuzione di trattamenti insetticidi, acaricidi o con prodotti tossici per le api. In presenza di fioritura del cotico erboso, è obbligatorio procedere allo sfalcio dello stesso 48 ore prima del trattamento.*

#### **MELO E PERO da fioritura a allegagione**

**TICCHIOLATURA:** si raccomanda di mantenere opportuna protezione anticipando possibili piogge, ricorrendo a dithianon, dodina, captano, propineb, metiram, fluazinam o pentiopirad o in casi di particolare gravità, a prodotti specifici. Sulle varietà sensibili a **MARCIUMI CALICINI** preferire prodotti a duplice attività.

Le infezioni della pioggia del 4 aprile sono rilevate evase su melo.

**OIDIO:** intervenire con zolfo o nelle situazioni più problematiche ricorrere a bupirimate, ciflufenamid o quinoxifen

**CARPOCAPSA:** si rilevano le prime occasionali catture; il volo si attende in modo più diffuso in questa settimana.

**TENTREDINE:** verificato il superamento soglia (20 adulti/trappola da inizio volo o 10% corimbi infestati) e la completa caduta petali, intervenire con acetamiprid in caso di necessità

**ERIOFIDE RUGGINOSO:** in caso di attacchi rilevati lo scorso anno, è possibile un intervento con abamectina

#### **DRUPACEE**

- **PESCO** ingrossamento frutticino

**CIDIA MOLESTA:** il volo prosegue ma complessivamente è contenuto.

**AFIDE VERDE:** intervenire al superamento del 3% su nettarine e 10% su pesche di germogli infestati con: spirotetramat, imidacloprid, acetamiprid, thiametoxam o clothianidin

**TRIPIDI:** in caso di danni rilevati la passata annata, intervenire con clorpirifos metile, spinosad o formentanate

- **SUSINO** allegagione-ingrossamento frutticino

**TENTREDINE:** intervenire da caduta petali con imidacloprid

**AFIDI:** al superamento del 10% di germogli infestati e a completa caduta petali, intervenire con imidacloprid, acetamiprid, thiametoxam (attivi anche verso tentredini) o con flonicamid

**CIDIA FUNEBRANA:** è iniziato il volo degli adulti. Indicazioni per possibili trattamenti ovicidi saranno forniti nel prossimo comunicato

- **ALBICOCCO:** allegagione-ingrossamento frutticino e **CILIEGIO:** da fioritura a caduta petali

**APIOGNOMONIA:** la fase di scamicatura e di allungamento dei germogli è di massima suscettibilità alla quale corrisponde anche la maturazione dei periteci.

Si raccomanda di porre la massima attenzione in previsione di pioggia e di intervenire preferibilmente con fenbuconazolo. Aggiungere Zolfo per **OIDIO** su albicocco.

**MONILIA CILIEGIO:** in caso di condizioni favorevoli, si consiglia di rinnovare la protezione sulle varietà ancora in fioritura

#### **VITE**

**PERONOSPORA e OIDIO:** nei vigneti in fase di germogliamento più avanzato eseguire un trattamento preventivo di copertura anticipando una possibile precipitazione. Aggiungere zolfo per la contemporanea difesa da oidio.

**TIGNOLETTA:** è iniziato il volo degli adulti