

Comunicato del 27 aprile 2015

Periodo complessivamente instabile con piogge sparse specie a inizio settimana. Temperature gradualmente in rialzo.

MELO E PERO da fine caduta petali a allegagione-inizio cascola

TICCHIOLATURA: le condizioni meteorologiche sono predisponenti a infezioni e marciumi. Si raccomanda di mantenere opportuna protezione anticipando le piogge, ricorrendo a dithianon, dodina, captano, propineb, metiram, fluazinam o pentiopirad. In casi di particolare gravità o su vegetazione non protetta ricorrere a prodotti specifici (IBE, verificare le singole registrazioni, da soli o in miscela). Sulle varietà sensibili a **MARCIUMI CALICINI** preferire prodotti a duplice attività.

OIDIO: intervenire con zolfo o nelle situazioni più problematiche ricorrere a bupirimate, ciflufenamid o quinoxifen

COLPO DI FUOCO: le temperature non risultano limitanti.

CARPOCAPSA: continuano le catture di adulti; interventi con clorantraniliprole saranno da posizionarsi nella prossima settimana.

AFIDE GRIGIO: alla comparsa delle reinfestazioni intervenire con:imidacloprid, thiametoxam, azadiractina o spirotetramat

DRUPACEE

- **PESCO** ingrossamento frutticino

CIDIA MOLESTA: il volo prosegue ma complessivamente è contenuto. Interventi larvicidi, da effettuarsi in caso di stretta necessità, possono esser posizionati da questa settimana.

AFIDE VERDE: intervenire al superamento del 3% su nettarine e 10% su pesche di germogli infestati con: spirotetramat, imidacloprid, acetamiprid, thiametoxam o clothianidin

TRIPIDI: in caso di danni rilevati la passata annata, intervenire con clorpirifos metile, spinosad o formentanate

- **SUSINO** ingrossamento frutticino

CIDIA FUNEBRANA: prosegue il volo degli adulti e si segnala l'inizio dell'ovideposizione. Con scarsa allegagione, al superamento di 10 catture/trappola/settimana intervenire con clorantraniliprole o triflumuron

TENTREDINE: intervenire da caduta petali con imidacloprid

AFIDI: al superamento del 10% di germogli infestati e a completa caduta petali, intervenire con imidacloprid, acetamiprid, thiametoxam (attivi anche verso tentredini) o con flonicamid

- **ALBICOCCO:** ingrossamento frutticino e **CILIEGIO:** da caduta petali a allegagione

APIOGNOMONIA: la fase di scamiciatura e di allungamento dei germogli è di massima suscettibilità alla quale corrisponde anche la maturazione dei periteci.

Si raccomanda di porre la massima attenzione in considerazione della settimana instabile e di intervenire preferibilmente con fenbuconazolo. Aggiungere Zolfo per **OIDIO** su albicocco.

MOSCA CILIEGIO: si consiglia di installare le trappole

VITE

PERONOSPORA e OIDIO: rinnovare la difesa in considerazione della rapida evoluzione del germogliamento anticipando le prossime piogge. Aggiungere zolfo per la contemporanea difesa da oidio.

TIGNOLETTA: prosegue il volo degli adulti.