

Comunicato del 22 giugno 2015

ATTENZIONE: PER TUTTI GLI INTERVENTI VERIFICARE I TEMPI DI CARENZA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

Tra martedì e mercoledì si attende il passaggio di una perturbazione caratterizzata anche da temporali violenti. La settimana proseguirà con giornate soleggiate alternate a possibili velature del cielo.

CIMICI E MIRIDI: prosegue il significativo incremento delle popolazioni, tanto su incolti, medicai, ornamentali che nei frutteti. Sono presenti anche alcuni deformi. Si raccomanda di valutare attentamente la situazione aziendale e gli sfalci dei medicai limitrofi; se necessario ricorrere ad interventi per altri fitofagi che siano attivi anche verso questi insetti (es. clorpirifos metile).

MELO E PERO

MACULATURA BRUNA: mantenere opportuna protezione con fludioxonil+ciprodinil, tebuconazolo+fluopirad, pyraclostrobin+boscalid, fludioxonil, boscalid, trifloxistrobin, pyraclostrobin, fluazinam, tebuconazolo, fosetil al, captano, thiram o ziram. In presenza di **TICCHIOLATURA**, segnalata su diverse aziende, si raccomanda di ricorrere a prodotti a duplice valenza per contenere le infezioni secondarie.

OIDIO: intervenire con zolfo, bupirimate, ciflufenamid o quinoxifen

COLPO DI FUOCO: si rilevano alcune infezioni. Porre particolare attenzione a seguito di violenti temporali. Asportare tempestivamente eventuali fiori secondari e ogni organo colpito.

RAGNETTO (BRUSONE): sulle varietà sensibili, con temperature oltre 28°C, programmare un intervento con clofentezine, exitiazox, tebufenpirad, bifenazate, pyridaben, etoxazole o acequinocyl

CARPOCAPSA: il volo è iniziato anche se non generalizzato sull'intero territorio. A superamento soglia, indicativamente 5-6 giorni dopo inizio volo, sono possibili interventi ovicidi. Interventi larvicidi saranno indicati nel prossimo comunicato

EULIA: presenza di adulti, uova e larve. In caso di superamento soglia (50 adulti trappola o 5% germogli infestati) programmare un intervento larvicida con *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad o clorpirifos metile

PSILLA: monitorare la situazione aziendale e in caso di necessità intervenire con olio bianco estivo.

DRUPACEE

MONILIA: con condizioni climatiche favorevoli si raccomanda l'esecuzione di un trattamento con prodotti specifici (verificare le singole registrazioni)

• **CILIEGIO**

DROSOPHILA SUZUKII: mantenere la opportuna difesa ricorrendo a prodotti a base di spinetoram, dimetoato o deltametrina. Interventi a base di spinosad o fosmet per altre avversità hanno effetti collaterali anche verso suzukii

MOSCA CILIEGIO: le condizioni di suscettibilità sono contenute. Salvo casi particolari non si consigliano ulteriori interventi.

AFIDI: alla presenza riscontrata in aree ad elevato rischio o con il 3% di organi colpiti in altre zone, intervenire con acetamiprid o deltametrina attivi anche per altri fitofagi

• **PESCO**

CIDIA MOLESTA: presenza di adulti, uova e larve. Al superamento della soglia di 10 catture/trappola/settimana, intervenire con spinosad, emamectina, thiacloprid o etofenprox.

ANARSIA: sostituire fondi e feromoni per il prossimo volo

• **SUSINO**

CIDIA FUNEBRANA: adulti, uova e larve. Al superamento di 10 catture/trappola/settimana, intervenire con emamectina, thiacloprid, fosmet, etofenprox o spinosad.

OIDIO: intervenire con zolfo, IBE o trifloxistrobin+tebuconazolo

VITE

PERONOSPORA e OIDIO: mantenere protetta la vegetazione senza allungare il turno di intervento. Aggiungere zolfo o prodotti specifici per la contemporanea difesa da oidio.

BOTRITE: nelle varietà in prechiusura grappolo è possibile intervenire con: fluopiram, fluazinam, fenexamid, pirimetanil, fludioxonil+ciprodinil, fenpirazamine, boscalid o aureobasidium pullulans, *Bacillus amyloliquefaciens* o *subtilis*, bicarbonato di K

SCAFOIDEO: primo intervento con prodotti a base di acetamiprid, clorpirifos etile, clorpirifos metile, etofenprox, thiametoxam, piretrine; secondo intervento dopo circa 30 giorni.

TIGNOLETTA: la situazione rilevata in campo è molto disforme. In caso di necessità intervenire con *Bacillus thuringiensis*, spinosad, emamectina.

CERCOSPORA BIETOLA

Presenza di pustole rilevate in campo. Dove non si sia già eseguito, intervenire sulle varietà sensibili con : prodotti rameici, clortalonil, difenconazolo, tetraconazolo, fenpropidin, procloraz, ciproconazolo, propioconazolo, flutriafol anche in miscela tra loro.