CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE MODENA

Comunicato del 6 luglio 2015

ATTENZIONE: PER TUTTI GLI INTERVENTI VERIFICARE I TEMPI DI CARENZA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

La settimana sarà complessivamente soleggiata con temperature elevate. Non si esclude a metà periodo il passaggio di una corrente atlantica che potrà portare addensamenti e locali rovesci.

CIMICI E MIRIDI: si raccomanda di verificare con frequenza la situazione aziendale per identificare la possibile presenza di *Halyomorpha.*
Valutare attentamente anche gli sfalci dei medicai limitrofi per possibili migrazioni di miridi.
Se necessario ricorrere ad interventi per altri fitofagi che siano attivi anche verso questi insetti (es.clorpirifos metile).
A conseguenza delle punture di miridi e cimici, da qualche settimana sono presenti frutti deformi.

MELO E PERO

MACULATURA BRUNA: mantenere opportuna protezione, anche in considerazione della presenza segnalata in alcuni campi. In presenza di **TICCHIOLATURA**, ricorrere a prodotti a duplice valenza per contenere le infezioni secondarie.
OIDIO: intervenire preferibilmente con zolfo
COLPO DI FUOCO: si rilevano alcune infezioni. Asportare tempestivamente eventuali fiori secondari e ogni organo colpito.
CARPOCAPSA: presenza di adulti ancora difforme sul territorio. A superamento soglia, è possibile ricorrere a interventi larvicidi (spinosad, emamectina, fosmet o clorpirifos etile).
EULIA: generazione in esaurimento Solo in caso di stretta necessità re intervenire con *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad o clorpirifos metile
PSILLA: monitorare la situazione aziendale e in caso di necessità intervenire con olio bianco estivo. Con melata sono consigliati lavaggi.

DRUPACEE

MONILIA: all'insorgere di condizioni climatiche favorevoli è possibile intervenire con prodotti specifici (verificare le singole registrazioni)

- **CILIEGIO**

DROSOPHILA SUZUKII e MOSCA: salvo casi particolari non si consigliano ulteriori interventi.

- **PESCO**

CIDIA MOLESTA: presenza di adulti, uova e larve. Al superamento della soglia di 10 catture/trappola/settimana, intervenire con spinosad, emamectina, thiacloprid o etofenprox.
ANARSIA: presenza di adulti uova e larve. Dopo 8-9 giorni da superamento soglia (7 adulti/trappola/settimana o 10 adulti/trappola/2 settimane) sono consigliati interventi con *Bacillus thuringinesis,* spinosad, thiacloprid, etofenprox o indoxacarb

- **SUSINO**

CIDIA FUNEBRANA: adulti, uova e larve. Al superamento di 10 catture/trappola/settimana, intervenire con emamectina, thiacloprid, fosmet, etofenprox o spinosad.
OIDIO: intervenire preferibilmente con zolfo

VITE

FLAVESCENZA DORATA: la situazione territoriale della malattia è in progressivo peggioramento. Si registra anche un incremento delle infezioni di **MAL DELL'ESCA.** Rimuovere tempestivamente la vegetazione sintomatica.
SCAFOIDEO: il secondo intervento obbligatorio sarà da posizionarsi dopo circa 30 giorni rispetto al primo con prodotti a base di acetamiprid, clorpirifos etile, clorpirifos metile, etofenprox, thiametoxam o piretrine.
PERONOSPORA e OIDIO: mantenere protetta la vegetazione senza allungare il turno di intervento soprattutto in presenza di macchie sporulanti su femminelle. Aggiungere zolfo o prodotti specifici per la contemporanea difesa da oidio.
NB: dal 30 giugno non sono più possibili interventi con ditiocarbammati in PI.
TIGNOLETTA: la situazione rilevata in campo è molto disforme. In caso di necessità intervenire con *Bacillus thiringiensis*, spinosad, emamectina.
CICALINE: popolazioni in aumento. Se necessario intervenire con prodotti specifici eventualmente integrabili con la difesa dello scafoideo.

POMODORO

NOTTUA GIALLA: volo segnalato anche se non omogeneo sul territorio. Al superamento soglia (2 piante su 30 infestate da uova o larve) intervenire con: clorantraniprole o con *Bacillus thuringensis,* virus Hear NPV, emamectina, indoxacarb, metalflumizone , metoxifenozid, spinosad , azadiractina,cipermetrina, deltametrina, lambdacialotrina, zetacipermetrina

MAIS

PIRALIDE: il volo è iniziato o imminente. Salvo casi di particolare gravità per la difesa si rimanda la prossimo comunicato.
DIABROTICA: presenza di adulti rilevata in campo.