

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | <b>Territorio provinciale di MODENA</b> |
|  | <b>Bollettino di Produzione</b>         |
|  | <b>Integrata e Biologica</b>            |

**n. 21 del 27 luglio 2015**

PREVISIONI DEL TEMPO

---

**METEO: SETTIMANA ANCORA IN CONDIZIONI DI DISAGIO BIOCLIMATICO**

**Previsioni della settimana dal 28 luglio al 2 agosto 2015:** Temperature in calo giovedì 30 con possibili rovesci e temporali, nuova diminuzione delle temperature e possibili piogge nel fine settimana.

Martedì 28 e mercoledì 29 sereno con temperature massime in risalita fino a 32- 34°C. Nella giornata di giovedì infiltrazioni di aria più fresca determineranno un peggioramento con rovesci e temporali più persistenti sul settore occidentale della regione in rapido transito verso est in giornata. Venerdì condizioni di nuvolosità variabile. Nel fine settimana si profila un peggioramento più deciso per il transito di una nuova perturbazione, con rovesci e temporali dalla serata di sabato e per la giornata di domenica. Temperature in flessione nella giornata di giovedì con valori massimi inferiori a 30 gradi. Aumento termico tra venerdì e sabato ma con successiva decisa flessione nella giornata di domenica.

Per informazioni dettagliate e in aggiornamento consultate le [previsioni meteo ARPA Emilia Romagna](#)



**BOLLETTINO DI PRODUZIONE INTEGRATA**

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b><i>DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA 2015</i></b> |
|---------------------------------------------------------|

Con Determinazione del Responsabile Servizio Produzioni vegetali n. 3047/2015 è stato approvato l'aggiornamento della fase di coltivazione dei DPI 2015. L'atto citato contiene le modifiche apportate alla edizione 2014. L'aggiornamento ha ricevuto il parere di conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata.

Tutti i testi integrali 2015 delle singole colture e l'atto di approvazione sono scaricabili dal sito E-R Agricoltura e pesca all'indirizzo:

---

|                        |
|------------------------|
| BOLLETTINO IRRIGAZIONE |
|------------------------|

Elaborazione del 21/07/2015

Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet, le seguenti colture: Cocomero, Melone ed orticole in serra o in tunnel e barbabietola da zucchero, cipolla, mais, soia, fagiolino, erba medica, prato stabile, fragola, cocomero, melone, patata, pomodoro da industria e tutte le orticole in pieno campo, colture arboree e i vigneti.

Si ricorda che l'irrigazione dei vigneti è consentita esclusivamente fino alla fase di invaiatura.

- Fragola Solo nelle varietà rifioventi, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet

- Cipolla irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. Per le varietà ancora in campo nelle quali sia evidente il collasso del collo sospendere definitivamente l'irrigazione.

- Patata irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. Si consiglia di sospendere definitivamente l'irrigazione nelle varietà che presentano almeno il 20% di foglie ingiallite. Sospendere le irrigazioni nelle coltivazioni di varietà precoci e medio precoci.

- Pomodoro irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. Si ricorda di sospendere le irrigazioni al raggiungimento del 25% di bacche rosse

- Bietola da zucchero Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. Sospendere le irrigazioni nelle coltivazioni di varietà di bietole del primo e del secondo modulo di estirpo

- Bietola da seme sospendere definitivamente l'irrigazione.

- Aglio sospendere definitivamente l'irrigazione.

In caso di pioggia, per determinare il periodo di sospensione dell'irrigazione, occorre dividere i mm letti con il pluviometro per il consumo giornaliero della coltura interessata. Esempio: una pioggia di 35 mm su un susino con interfilare inerbito che consuma 3.5 mm, determinerà un periodo di sospensione dell'irrigazione pari a 10 giorni (35/3.5)

#### Livello PO al punto rilevamento SABBIONCELLO

| Data       | Livello  |
|------------|----------|
| 13.07.2015 | mt. 8.42 |

Si raccomanda di non sottovalutare i consumi colturali (evapotraspirati) che risultano ai livelli massimi stagionali per la maggior parte delle colture. I consumi specifici riferiti alle sopracitate colture sono disponibili gratuitamente sul servizio di assistenza regionale gratuito Irrinet.

Si ricorda che l'irrigazione post-trapianto è sempre consentita

#### **COLTURE ERBACEE**

##### **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO fase: inizio raccolta**

OIDIO si segnala presenza. In caso di attacchi in forma epidemica intervenire con Zolfo  
CERCOSPORA: si sono rilevate le prime pustole. In funzione dell'andamento stagionale intervenire con: Prodotti Rameici o Clortalonil (max 2 trattamenti) oppure IBE: Procloraz o Procloraz+Flutriafol o Procloraz+Propiconazolo o Procloraz+Ciproconazolo o Tetraconazolo o Difenconazolo+Fenpropidin (max 1 trattamento).

Si consiglia di impiegare gli IBE in miscela con prodotti con differente meccanismo d'azione, da soli non più di una volta all'anno.

Contro quest'avversità max 3 trattamenti con prodotti di sintesi, escluso Prodotti rameici..

##### **POMODORO fase: sviluppo vegetativo - raccolta**

PERONOSPORA in campo si rilevano infezioni. Mantenere un'adeguata protezione della coltura intervenendo in previsione di pioggia o con condizioni favorevoli alla malattia, con: Prodotti rameici o Azoxistrobin\* (max 2 trattamenti) o Pyraclostrobin\* o Famoxadone\* (\*tra Azoxistrobin, Pyraclostrobin, Famoxadone in totale max 3 trattamenti) o Propineb\* o Metiram\* (\*in totale max 3 trattamenti) o Propamocarb o Zoxamide (max 4 trattamenti), eventualmente addizionati a Fosetil Al. In caso di interventi su vegetazione non protetta utilizzare fungicidi ad attività curativa: Cimoxanil (max 3 trattamenti) o Cyazofamide (max 3 trattamenti) oppure Metalaxil\* o Metalaxil M\* (\*in totale max 3 trattamenti) oppure Dimetomorf\*\* o Iprovalicarb\*\* o Mandipropamide \*\* (\*\*in totale max 4 trattamenti) o

---

Ametoctradina + Dimetomorf o Ametoctradina + Metiram (con Ametoctradina max 3 interventi in un anno).

In data 26 maggio è stata emessa una deroga valida per l'intero territorio della Regione EMilia-Romagna per l'uso del Benalaxil per la difesa del pomodoro dalla peronospora come alternativa a Metalaxil\* o Metalaxil M\*

NOTTUA GIALLA si sono rilevate catture. Controllare la coltura e se si supera la soglia (2 piante su 30 infestate da uova o larve) intervenire con: Bacillus thuringensis, Virus Hear NPV, Azadiractina, Clorantraniprole (max 2 trattamenti), Emamectina (max 2 trattamenti), Indoxacarb (max 4 trattamenti), Metalflumizone (max 2 trattamenti), Metoxifenozone (max 1 trattamento), Spinosad (max 3 trattamenti) o Piretroidi (Cipermetrina, Deltametrina, Lambdacialotrina, Zetacipermetrina; indipendentemente dall'avversità in totale con piretroidi max 2 trattamenti).

RAGNO ROSSO in caso di presenza di focolai precoci intervenire con: Abamectina o Acequinocyl o Bifenazate o Clofentezine o Etoxazole o Exitiazox o Fenpiroximate o Tebufenpirad.

#### **MAIS**

---

PIRALIDE: continuano le catture.

DIABROTICA: presenza di adulti in calo

#### **SOIA chiusura interfila**

---

RAGNETTO ROSSO: in presenza di 10 forme mobili per foglia (campione di 100 foglie) intervenire con Exitiazox. Se la soglia viene superata solo sui bordi dell'appezzamento, limitarsi a trattare quest'ultimi.

Se si considera di intervenire con lanci di Phytoseiulus persimilis la soglia di intervento è di 0,1-0,2 acari per foglia.

|                        |
|------------------------|
| <b>COLTURE ARBOREE</b> |
|------------------------|

#### **PESCO fase accrescimento frutti - raccolta**

---

ANARSIA: in campo si segnala presenza di danni. Intervenire Dopo 8-9 giorni da superamento soglia (7 adulti/trappola/settimana o 10 adulti/trappola/2 settimane) con prodotti larvicidi: Bacillus Thuringiensis o Emamectina (max 2 trattamenti all'anno) o Etofenprox (max 2 trattamenti all'anno) o Indoxacarb (max 4 trattamenti all'anno) o Spinosad (max 3 trattamenti all'anno) o Thiacloprid (max 1 trattamento all'anno, 2 se non si sono utilizzati altri neonicotinoidi)

CIDIA MOLESTA: continua il terzo volo e la nascita larvale. Al superamento della soglia (10 catture per trappola a settimana) utilizzare larvicidi: Emamectina (max 2 trattamenti) o

---

Etofenprox (max 2 trattamenti all'anno) o Fosmet (max 3 trattamenti) o Indoxacarb (max 4 trattamenti) o Metossifenozone (tra Triflumuron e Metossifenozone max 4 trattamenti) o Spinosad (max 3 trattamenti) o Clorpirifos etile (max 3 trattamenti) ) o Thiacloprid (max 1 trattamento all'anno, 2 se non si sono utilizzati altri neonicotinoidi).

Tra Clorpirifos metile, Clorpirifos etile, Formetanate e Fosmet max 3 trattamenti all'anno.

OIDIO: sulle varietà sensibili, nelle zone ad alto rischio di collina o in peschieti con forti infezioni negli anni precedenti intervenire con Zolfo o Bupirimate o IBE ( Ciproconazolo o Fenbuconazolo o Miclobutanil o Penconazolo o Propiconazolo o Tebuconazolo o Tetraconazolo; max 4 trattamenti con IBE, 2 con Tebuconazolo) o Quinoxifen (max 3 trattamenti) o Tryfloxistrobin+tebuconazolo (tra Pyraclostrobin e Tryfloxistrobin max 3 trattamenti).

RAGNO ROSSO si segnalano infestazioni. In caso di forti attacchi, oltre 60% di foglie occupate, intervenire con: Abamectina, Acequinocyl, Etoxazole, Exitiazox, Tebufenpirad, o Pyridaben. Max 1 trattamento con acaricidi

#### **SUSINO fase accrescimento frutti - raccolta**

---

CIDIA FUNEBRANA: continua il nuovo volo. Si prevede l'inizio dell'ovodeposizione in settimana. Al superamento di 10 catture/trappola/settimana, intervenire con larvicidi.

RAGNO ROSSO si segnalano infestazioni. In caso di forti attacchi, oltre 60% di foglie occupate, intervenire con: Abamectina, Clofentezina, Etoxazole o Pyridaben. Max 1 trattamento contro quest'avversità.

#### **MELO fase accrescimento frutti**

---

TICCHIALATURA continuare la difesa dove sono presenti macchie sulla vegetazione per limitare le infezioni secondarie che si verificano anche con nebbie o rugiade. Nei frutteti infetti si consiglia di mantenere protetta la vegetazione utilizzando Captano o Dithianon (tra Dithianon e Captano max 12 trattamenti per Cvs raccolte prima di Golden, 14 Cvs raccolte da Golden in poi) o Fluazinam o Pentiopirad (max 2 trattamenti) o Tebuconazolo+Fluopyram (max 2 trattamenti Tra Pentiopirad, Fluopiram e Boscalid max 4 interventi all'anno in due blocchi distanti almeno 3 prodotti con diverso meccanismo d'azione) oppure IBE (Ciproconazolo o Difeconazolo o Fenbuconazolo o Penconazolo o Tetraconazolo; max 4 trattamenti con IBE) miscelati a prodotti di copertura.

**DEROGA: In data 29/06/2015 è stata concessa una deroga valida per l'intero territorio regionale per l'esecuzione di un ulteriore intervento con Captano o Dithianon per la difesa del melo dalla ticchialatura.**

CARPOCAPSA il volo di seconda generazione continua, catture spesso in aumento. In campo si rilevano uova in diversi stadi e bacato. Il modello stima la presenza del 100% di adulti, oltre il 90% di uova e 85-90% di larve. Dove si supera la soglia di 2 catture per trappola/settimana, intervenire con larvicidi Virus della granulosa oppure Emamectina (max 2 trattamenti), oppure Clorpirifos etile o Fosmet (max 4 trattamenti come somma di Clorpirifos etile, Clorpirifos

---

metile, Fosmet) o Spinosad (max 3 trattamenti) o Thiacloprid (max 1 trattamento, 2 se non sono stati usati altri neonicotinoidi)..

EULIA ARCHIPS PANDEMIS si segnala l'inizio del volo.

#### **PERO fase accrescimento frutti - raccolta**

**TICCHIOLATURA** continuare la difesa dove sono presenti macchie sulla vegetazione per limitare le infezioni secondarie che si verificano anche con nebbie o rugiade. Nei frutteti infetti si consiglia di mantenere protetta la vegetazione utilizzando Captano (max 6 interventi) o Dithianon o Pentiopirad (max 2 trattamenti) o Tebuconazolo+Fluopyram (max 2 trattamenti) oppure IBE (Ciproconazolo o Difeconazolo o Fenbuconazolo o Penconazolo o Tebuconazolo o Tetraconazolo; max 3 trattamenti con Tebuconazolo, 4 in totale con IBE) miscelati a prodotti di copertura.

**DEROGA:** In data 29/06/2015 è stata concessa una deroga valida per l'intero territorio regionale per l'esecuzione di un ulteriore intervento con Captano o Dithianon per la difesa del pero dalla ticchiolatura e maculatura bruna

Tra Pentiopirad, Fluopiram e Boscalid max 4 interventi all'anno in due blocchi distanti almeno 3 prodotti con diverso meccanismo d'azione

**MACULATURA BRUNA** le condizioni climatiche sono di rischio medio. Si sono rilevati sintomi in campo. Si consiglia di continuare una difesa adeguata mantenendo protetta la vegetazione soprattutto in concomitanza d'irrigazioni o con elevata umidità o previsioni di piogge. Utilizzare: Captano (max 6 trattamenti, non miscelare e distanziare di 20 giorni da olio bianco per non causare fitotossicità) o Thiram (max 8 trattamenti) o Boscalid (max 3 trattamenti) o Pyraclostrobin o Trifloxystrobin (utilizzare Pyraclostrobin e Trifloxystrobin in miscela con un fungicida a diverso meccanismo d'azione, in totale max 3 trattamenti tra i 2) o Ciprodinil+Fludioxonil (max 3 trattamenti) o Fludioxonil (max 2 trattamenti se impiegato da solo) o Iprodione (max 2 trattamenti, attenzione fitotossico su Decana) o Tebuconazolo (con IBE in totale max 4 trattamenti) o Tebuconazolo+Fluopyram (max 2 trattamenti)

**CARPOCAPSA** il volo di seconda generazione continua, catture spesso in aumento. In campo si rilevano uova in diversi stadi e bacato. Il modello stima la presenza del 100% di adulti, oltre il 90% di uova e 85-90% di larve. Dove si supera la soglia di 2 catture per trappola/settimana, intervenire con larvicidi Virus della granulosi oppure Emamectina (max 2 trattamenti), oppure Clorpirifos etile o Fosmet (max 4 trattamenti come somma di Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Fosmet) o Spinosad (max 3 trattamenti).

EULIA ARCHIPS PANDEMIS si segnala l'inizio del volo.

**MIRIDI** popolazioni in aumento, prestare particolare attenzione nei frutteti dove si sono verificati danni nella scorsa annata e in vicinanza di medicei, soprattutto in concomitanza di sfalci.

**CIMICI** Halyomorpha presenze in aumento di adulti e forme giovanili. Verificare la situazione aziendale soprattutto dove si sono verificati danni nell'annata precedente.

---

Si rilevano danni anche a livelli elevati sulle varietà estive

**DEROGA** per l'intero territorio dei comuni di Spilamberto, Castelfranco Emilia, San Cesario s/P, Nonantola, Modena, Bomporto, Ravarino, Soliera, Bastiglia e Campogalliano in provincia di Modena per eseguire un ulteriore intervento con la s.a. Clorpirifos metile per la difesa del pero da contemporanei attacchi di cocciniglia di S. Josè (*Comstockaspis perniciosus*) e Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)

**ANTICASCOLA:** nei frutteti e sulle varietà più suscettibili a cascole di pre-raccolta è consentito l'impiego dei prodotti anticascia a base di NAA (= acido alfa-naftilacetico). Per ottenere un effetto prolungato, senza effetti negativi sullo sviluppo dei frutti, il dosaggio totale può essere frazionato su 2-3 interventi alla distanza di 7-10 giorni uno dall'altro, iniziando a circa 30 giorni dalla raccolta.

#### **VITE fase inizio invaiatura**

**PERONOSPORA** in campo si rileva la presenza d' infezioni. in base agli interventi precedenti mantenere protetta la vegetazione preferibilmente con Prodotti rameici.

**OIDIO** in campo si rilevano sintomi: utilizzare Zolfo

**TIGNOLETTA** terzo volo in corso. Rilevate le prime uova, interventi con larvicidi dalla prossima settimana.

**FLAVESCENZA DORATA:** aumento dei sintomi e presenza di scafoideo. Si raccomanda di eliminare le parti colpite.

Nell'ambito delle Prescrizioni emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale, ( [QUI](#) la determina) anche nel 2015 è obbligatorio effettuare su tutto il territorio provinciale **DUE TRATTAMENTI** insetticidi contro *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza dorata della vite.

**Da questa fase si può posizionare il SECONDO INTERVENTO, dopo circa 30 giorni dal primo, comunque entro il 31 luglio 2015 con:** Acetamiprid (Epic SL) o Clorpirifos-etile (max 1 trattamento), Clorpirifos-metile (max 1 trattamento), Etofenprox o Thiametoxam (max 1 trattamento)

**ATTENZIONE** è vietato l'impiego di **FOSFORGANICI** per le aziende che aderiscono alla **DIA**. Prima di eseguire qualsiasi trattamento insetticida è obbligatorio eliminare eventuali piante spontanee fiorite sfalciando il cotico erboso sottostante il vigneto, 24-48 ore prima dell'intervento.



## **BOLLETTINO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA**

---

Tutte le operazioni colturali devono volgere a mantenere un equilibrio vegeto-produttivo delle piante, al fine di aumentare le difese naturali e diminuire i potenziali attacchi delle avversità, salvaguardando l'ambiente circostante.

|                        |
|------------------------|
| <b>COLTURE ARBOREE</b> |
|------------------------|

---

**PESCO fase accrescimento frutti - raccolta**

OIDIO intervenire da questa fase con Zolfo

ANARSIA: in campo si segnala presenza di danni. Intervenire Dopo 8-9 giorni da superamento soglia (7 adulti/trappola/settimana o 10 adulti/trappola/2 settimane) con prodotti larvicidi : Bacillus Thuringiensis o Spinosad (max 3 trattamenti all'anno).

CIDIA MOLESTA: continua il volo di seconda generazione e la nascita larvale. Al superamento della soglia (10 catture per trappola a settimana) utilizzare larvicidi: Al superamento della soglia (10 catture per trappola a settimana) utilizzare larvicidi: Bacillus Thuringiensis o Spinosad (max 3 trattamenti all'anno).

---

**SUSINO fase accrescimento frutti - raccolta**

CIDIA FUNEBRANA: è iniziato il nuovo volo. Si prevede l'inizio dell'ovodeposizione in settimana. Al superamento di 10 catture/trappola/settimana, intervenire dalla prossima settimana intervenire con larvicidi.

---

**MELO fase accrescimento frutti**

TICCHIOLATURA continuare la difesa dove sono presenti macchie sulla vegetazione per limitare le infezioni secondarie che si verificano anche con nebbie o rugiade. Nei frutteti infetti si consiglia di mantenere protetta la vegetazione utilizzando Prodotti Rameici o Polisolfuro di Calcio .

CARPOCAPSA il volo di seconda generazione continua, catture spesso in aumento. In campo si rilevano uova in diversi stadi e bacato. Il modello stima la presenza del 100% di adulti, oltre il 90% di uova e 85-90% di larve. Dove si supera la soglia di 2 catture per trappola/settimana, intervenire con larvicidi Virus della granulosa oppure Spinosad (max 3 trattamenti).

EULIA ARCHIPS PANDEMIS si segnala l'inizio del volo.

---

**PERO fase accrescimento frutti - raccolta**

TICCHIOLATURA continuare la difesa dove sono presenti macchie sulla vegetazione per limitare le infezioni secondarie che si verificano anche con nebbie o rugiade. Nei frutteti infetti si consiglia di mantenere protetta la vegetazione utilizzando Prodotti Rameici o Polisolfuro di Calcio

---

CARPOCAPSA il volo di seconda generazione continua, catture spesso in aumento. In campo si rilevano uova in diversi stadi e bacato. Il modello stima la presenza del 100% di adulti, oltre il 90% di uova e 85-90% di larve. Dove si supera la soglia di 2 catture per trappola/settimana, intervenire con larvicidi Virus della granulosa oppure Spinosad (max 3 trattamenti).  
EULIA ARCHIPS PANDEMIS si segnala l'inizio del volo.

#### VITE fase inizio invaiatura

PERONOSPORA mantenere protetta la vegetazione con interventi preventivi con Prodotti rameici.

OIDIO Nelle zone ad alto rischio utilizzare Zolfo.

TIGNOLETTA terzo volo in corso. Rilevate le prime uova, interventi con larvicidi dalla prossima settimana.

FLAVESCENTZA DORATA: aumento dei sintomi e presenza di scafoideo. Si raccomanda di eliminare le parti colpite.

Nell'ambito delle Prescrizioni emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale, ([QUI](#) la determina) anche nel 2015 è obbligatorio effettuare su tutto il territorio provinciale **DUE**

**TRATTAMENTI** insetticidi contro *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza dorata della vite.

**Da questa fase si può posizionare il SECONDO INTERVENTO, dopo circa 30 giorni dal primo, comunque entro il 31 luglio 2015 con: Piretrine pure.**

Ulteriori approfondimenti su norme e indicazioni generali si possono consultare sul sito:  
[www.tecpuntobio.it](http://www.tecpuntobio.it)

#### APPUNTAMENTI / NOTIZIE / NOTE

*il prossimo incontro si terrà LUNEDÌ 03 AGOSTO 2015 presso l'az Agricola dell' IIS L .*

*Spallanzani via Prati 56 Gaggio*

*Ore 10.00 visita attività sperimentale difesa cimici eseguita da Consorzio Fitosanitario di Modena*

*Ore 11.00 aggiornamento bollettino di produzione integrata e biologica*

Coordinamento a cura di:

Massimo Fornaciari Roberta Nannini (Consorzio Fitosanitario Modena)

Redazione e diffusione a cura di Massimo Fornaciari

con il supporto del Servizio Fitosanitario Regionale

---

**in collaborazione con:** Agrites-Gruppo Progeo - Consorzio Nazionale Bieticoltori - Associazione Nazionale Bieticoltori - Consorzio della Bonifica Burana - Consorzio Difesa Eurofrutta - Consorzio Agrario dell'Emilia - Co. di. ca. N. - C.E.R. su informazione del S.M.R.

**Consorzio fitosanitario di modena**

Via Santi 14 – Modena

Tel 059/240731 - Fax 059/221877 [www.fitosanitario.mo.it](http://www.fitosanitario.mo.it)

**PROBER** Piazza dei Martiri, 1 - 40121 Bologna Tel. 051/4211342 - Fax 051/4228880

[www.tecpuntobio.it](http://www.tecpuntobio.it) – [www.prober.it](http://www.prober.it)

Chi fosse interessato a ricevere il Bollettino di Produzione Integrata e Biologica può farne richiesta a [produzioneintegratamodena@fornaciarimassimo.com](mailto:produzioneintegratamodena@fornaciarimassimo.com)