CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE MODENA

Comunicato del 3 agosto 2015

ATTENZIONE: PER TUTTI GLI INTERVENTI VERIFICARE I TEMPI DI CARENZA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

Ci attendono ancora giornate calde e soleggiate. A fine settimana parziale instabilità che potrebbe portare addensamenti e possibili precipitazioni.

CIMICI E MIRIDI: si raccomanda di verificare con frequenza la situazione aziendale per identificare la possibile presenza di *Halyomorpha.*

Valutare attentamente anche gli sfalci dei medicai limitrofi per possibili migrazioni di miridi.

Se necessario ricorrere ad interventi per altri fitofagi che siano attivi anche verso questi insetti (es.clorpirifos metile o etofenprox concesso in deroga in PI).

A conseguenza delle punture di miridi e cimici, sono presenti frutti deformi in campo.

MELO E PERO –ingrossamento frutto, raccolta-

MACULATURA BRUNA: mantenere opportuna protezione, anche in considerazione della presenza segnalata in alcuni campi. In presenza di **TICCHIOLATURA**, ricorrere a prodotti a duplice valenza per contenere le infezioni secondarie.

OIDIO: intervenire preferibilmente con zolfo

COLPO DI FUOCO: in caso di infezioni asportare tempestivamente ogni organo colpito.

CARPOCAPSA: sostituire le trappole e i feromoni per l'imminente inizio del terzo volo.

EULIA e RICAMATORI: presenza di adulti rilevata sul territorio in modo disforme ma complessivamente modesta. Possibili interventi larvicidi saranno da posizionarsi a superamento soglia.

PSILLA: monitorare la situazione aziendale e in caso di necessità intervenire con olio bianco estivo. Con melata sono consigliati lavaggi.

DRUPACEE-raccolta-

MONILIA: all'insorgere di condizioni climatiche favorevoli è possibile intervenire con prodotti specifici (verificare le singole registrazioni)

- **PESCO**

CIDIA MOLESTA e ANARSIA: al superamento della soglia intervenire con prodotti larvicidi a base di *Bacillus thuringinesis* spinosad, thiacloprid, etofenprox, indoxacarb o emamectina.

- **SUSINO**

CIDIA FUNEBRANA: presenza di adulti. Compatibilmente con i tempi di carenza dopo 4-5 giorni da superamento soglia (10 catture/trappola/settimana) intervenire con emamectina, thiacloprid, fosmet, etofenprox o spinosad

VITE-inizio invaiatura

FLAVESCENZA DORATA: la situazione territoriale della malattia è in progressivo peggioramento. Si registra anche un incremento delle infezioni di **MAL DELL'ESCA.** Rimuovere tempestivamente la vegetazione sintomatica.

BOTRITE: sulle varietà sensibili e nella fase di invaiatura si consiglia l'intervento antibotritico con: fluopiram, fluazinam, fenexamid, pirimetanil, fludioxonil+ciprodinil, fenpirazamine, boscalid o aureobasidium pullulans, *Bacillus amyloliquefaciens o subtilis*, bicarbonato di K

PERONOSPORA e OIDIO: mantenere protetta la vegetazione senza allungare il turno di intervento soprattutto in presenza di macchie sporulanti su femminelle. Aggiungere zolfo per la contemporanea difesa da oidio.

TIGNOLETTA: presenza di adulti, uova e larve. A superamento soglia (5% grappoli infestati) si raccomanda un intervento con: bacillus thuringiensis, emamectina o spinosad

COCCINIGLIA: in alcuni contesti si segnala la presenza di reinfestazioni.

DISSECCAMENTO DEL RACHIDE: si segnalano diversi casi di questa fisiopatia