CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE MODENA

Comunicato del 17 agosto 2015

ATTENZIONE: PER TUTTI GLI INTERVENTI VERIFICARE I TEMPI DI CARENZA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

La settimana apre con parziale instabilità e non si escludono ulteriori precipitazioni. Miglioramento verso fine periodo.

CIMICI E MIRIDI: si raccomanda di verificare con frequenza la situazione aziendale per identificare la possibile presenza di *Halyomorpha.*

Sulla colture del melo e della vite anche per il crescente rischio di migrazioni, si invita ad intensificare il monitoraggio.

Valutare attentamente anche gli sfalci dei campi limitrofi (medicaio, sorgo, mais, incolti) per possibili migrazioni di miridi. Le popolazioni rilevate negli ultimi giorni sono in evidente aumento.

Se necessario ricorrere ad interventi per altri fitofagi che siano attivi anche verso questi insetti (es.clorpirifos metile o etofenprox, concesso in deroga in PI).

MELO E PERO - raccolta-

MACULATURA BRUNA: mantenere opportuna protezione, anche in considerazione della presenza segnalata in alcuni campi. In presenza di **TICCHIOLATURA**, ricorrere a prodotti a duplice valenza per contenere le infezioni secondarie.

OIDIO: intervenire preferibilmente con zolfo

COLPO DI FUOCO: in caso di infezioni asportare tempestivamente ogni organo colpito.

CARPOCAPSA: presenza di adulti disforme sul territorio. A superamento soglia, verificando il rispetto dei tempi di carenza, intervenire con prodotti ad azione larvicida.

EULIA e RICAMATORI: presenza di adulti rilevata complessivamente modesta.

Possibili interventi larvicidi saranno da posizionarsi a superamento soglia.

DRUPACEE-raccolta-

MONILIA: all'insorgere di condizioni climatiche favorevoli è possibile intervenire con prodotti specifici (verificare le singole registrazioni)

- **PESCO**

CIDIA MOLESTA e ANARSIA: al superamento della soglia intervenire con prodotti larvicidi a base di *Bacillus thuringinesis* spinosad, thiacloprid, etofenprox, indoxacarb o emamectina.

- **SUSINO**

CIDIA FUNEBRANA: presenza di adulti, uova e larve. Compatibilmente con i tempi di carenza, dopo 4-5 giorni da superamento soglia (10 catture/trappola/settimana) programmare un trattamento larvicida con emamectina, thiacloprid, fosmet, etofenprox o spinosad

VITE

FLAVESCENZA DORATA: rimuovere tempestivamente la vegetazione sintomatica.

BOTRITE: sulle varietà sensibili intervenire con fluopiram, fluazinam, fenexamid, pirimetanil, fludioxonil+ciprodinil, fenpirazamine, boscalid, *Aureobasidium pullulans, Bacillus amyloliquefaciens o subtilis* o bicarbonato di K

PERONOSPORA: a protezione soprattutto delle femminelle può rendersi necessario un ulteriore intervento a base di rame. Aggiungere zolfo per la contemporanea difesa da oidio.

TIGNOLETTA: presenza di adulti, uova e larve. A superamento soglia (5% grappoli colpiti) si raccomanda un intervento con *Bacillus thuringinesis,* emamectina o spinosad.

COCCINIGLIA: in alcuni contesti si segnala la presenza di reinfestazioni.