CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE MODENA

Comunicato del 7 settembre 2015

ATTENZIONE: PER TUTTI GLI INTERVENTI VERIFICARE I TEMPI DI CARENZA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

Nel pomeriggio di sabato una violenta grandinata si è abbattuta sul territorio della bassa modenese causando notevoli danni alle colture prossime alla raccolta.
La settimana sarà complessivamente soleggiata con momenti di nuvolosità variabile.

CIMICI E MIRIDI: si raccomanda di verificare con frequenza la situazione aziendale per identificare la possibile presenza di *Halyomorpha e l'andamento delle popolazioni*.
Sulla colture del melo, del susino, della vite e del kaki, anche per il crescente rischio di migrazioni, si invita ad intensificare il monitoraggio.
Valutare attentamente anche gli sfalci dei campi limitrofi (medicaio, soia, sorgo, mais, incolti) per possibili migrazioni di miridi. Le popolazioni rilevate nelle ultime settimane sono in evidente aumento.
Se necessario compatibilmente con i tempi di carenza ricorrere ad interventi per altri fitofagi che siano attivi anche verso questi insetti (es.acetamiprid, thiametoxam, etofenprox).

VITE

BOTRITE e MARCIUME ACIDO: specie nelle zone coinvolte dalla grandinata o dai violenti temporali di sabato, è consigliato un intervento antibotritico, valutando il ricorso a molecole che abbiano attività anche verso il contenimento dei marciumi acidi.
Il trattamento dovrà essere fatto avendo cura di bagnare accuratamente il grappolo
FLAVESCENZA DORATA: rimuovere tempestivamente la vegetazione sintomatica.
HALYOMORPHA: in alcuni vigneti le popolazioni sono rilevate in incremento.
TIGNOLETTA: solo a superamento soglia (5% grappoli colpiti) è possibile un intervento con *Bacillus thuringinesis,* emamectina o spinosad.
COCCINIGLIA: in alcuni contesti si segnala la presenza di re infestazioni

POMACEE - raccolta-

COLPO DI FUOCO: si raccomanda un intervento tempestivo con prodotti rameici per disinfettare le ferite in caso di grandinata o violenti temporali. Con infezioni in atto asportare tempestivamente ogni organo colpito.
MARCIUMI (*Gleosporium*): nella fase di preraccolta e sulla varietà sensibili è possibile un intervento con fludioxonil, pyraclostrobin+boscalid o captano.
CARPOCAPSA (melo): presenza di adulti disforme sul territorio. Solo a superamento soglia, verificando il rispetto dei tempi di carenza, intervenire con prodotti ad azione larvicida sulle varietà a raccolta più tardiva. In caso di presenza di *Halyomorpha*, altre cimici o miridi preferire etofenprox
MOSCA: verso questo fitofago sono possibili interventi con fosmet, esche attivate con lufenuron o mediante le trappole attract and kill. Su Kaki è impiegabile anche etofenprox.