

Territorio provinciale di MODENA

n. 02 del 07 marzo 2016



BOLLETTINO DI DIFESA FITOSANITARIA **CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA**

PREVISIONI DEL TEMPO

METEO

Per informazioni dettagliate e in aggiornamento consultate le [previsioni meteo ARPA Emilia Romagna](#)

APPROVATI I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA 2016

I testi ufficiali dei **DISCIPLINARI 2016** sono pubblicati sul sito della Regione ER.

Si possono scaricare da qui

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2016>

CONCIMAZIONE

In generale i quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio previsionale calcolato adottando le indicazioni di seguito riportate oppure avvalendosi del software specifico scaricabile dal sito della Regione Emilia Romagna [Programma per formulazione del bilancio](#)

In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il modello semplificato secondo le schede a dose standard per coltura.

Occorre disporre delle informazioni relative alle caratteristiche chimico fisiche del terreno al momento della redazione del piano di fertilizzazione. Tale data deve essere controllabile

A tal fine si potranno seguire due vie:

1. consultare il Catalogo dei suoli all'indirizzo <https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/> per i territori regionali per i quali è disponibile;
2. effettuare opportune analisi di laboratorio.

Per alcune colture da seme è consentita solo l'utilizzo del metodo dose standard come indicato nelle norme di coltura.

I piani di fertilizzazione devono essere redatti in ciascuna annualità:

- entro il **28 febbraio per le colture erbacee e foraggere**
- entro il **15 aprile per le colture orticole, arboree e sementiere.**

COLTURE ARBOREE

PRODOTTI RAMEICI dal 2016 i disciplinari prevedono su tutte le colture un limite per l'utilizzo dei prodotti rameici pari a 6 kg di sostanza attiva (rame metallo) per ettaro nell'arco dell'anno

ALBICOCCO fase fioritura

MONILIA: dalla fase di inizio fioritura è consigliabile eseguire un intervento con: *Bacillus subtilis* (max 4 interventi) o Ciproconazolo o Fenbuconazolo o Propiconazolo o Tebuconazolo (in totale 3 trattamenti all'anno con IBE, 2 con Ciproconazolo o Propiconazolo o Tebuconazolo) o Ciprodinil+Fludioxinil (max 1 trattamento) o Fenexamid (max 2 trattamenti) o Fluopiram (max 2 trattamenti) o Pyraclostrobin + Boscalid (max 2 trattamenti) o Tryfloxistrobin + Tebuconazolo (max 2 trattamenti)

Pyraclostrobin e Tryfloxistrobin in totale max 2 trattamenti.

Boscalid e Fluopiram in totale max 3 trattamenti.

Contro questa avversità massimo 3 interventi all'anno con prodotti di sintesi.

CILIEGIO fase gemma gonfia

CORINEO: eseguire un intervento da questa fase con Prodotti Rameici (max 6 kg/ha) o Ziram (max 1 trattamento entro la fine fioritura) o Thiram. Tra Ziram e Thiram max 2 trattamenti.

COCCINIGLIA DI SAN JOSE': con "Politiol", preparato a base di olio minerale paraffinico e zolfo attivo anche contro ERIOFIDI, **per evitare danni da fitotossicità si dovrà intervenire entro la fase di gemme gonfia**, prima che compaia la nuova vegetazione. Dalla fase di rottura gemme utilizzare Olio minerale o Buprofezin (intervenire nella fase di bottoni fiorali) o Pyriproxifen (max 1 trattamento entro la prefioritura)

PESCO fase bottoni rosa

BOLLA: prosegue la difesa contro la bolla. Eseguire un ulteriore intervento una volta esaurita la persistenza del precedente e in previsione di una pioggia infettante.

I prodotti da utilizzare sono: Captano o Dodina (max 2 trattamenti) o Prodotti Rameici (attivi anche per BATTERIOSI) o Thiram o Ziram (max 1 trattamento)

Tra Captano, Thiram e Ziram in totale max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

COCCINIGLIA DI SAN JOSE': intervenire da questa fase con Olio minerale o Buprofezin o Pyriproxifen (max 1 trattamento entro pre-fioritura)

AFIDE VERDE se si supera in prefioritura il 3% di germogli infestati intervenire con: Acetamiprid (max 2 trattamento/anno utilizzabile in alternativa con Clothianidin, Imidacloprid o Thiamethoxan **utilizzabili solo in postfioritura**) o Flonicamid (max 1 trattamento) o Fluvalinate (max 1 trattamento in prefioritura se nell'anno precedenti non sono stati usati acaricidi) o Pirimicarb.

TRIPIDI. In presenza di danni nell'anno precedente intervenire in pre-fioritura con: Alfacypermetrina* o Betacyflutrin* o Cipermetrina* o Deltametrina* o Lambdacialotrina* o Zetacypermetrina* (*utilizzabili in alternativa, max 1 trattamento/anno).

SHARKA: verificare la presenza di fiori con anomalie del colore, sintomi della virosi.

CIDIA MOLESTA: installare le trappole per il monitoraggio degli adulti. Dove si intendono utilizzare sistemi di confusione/disorientamento ordinare i diffusori

SUSINO fase gemma gonfia – Cino giapponese inizio fioritura

BATTERIOSI: dalla fase di ingrossamento gemme in presenza di infezione intervenire con Prodotti rameici (max 6 kg/ha), attivi anche contro CORINEO

CORINEO: eseguire un intervento da questa fase con Prodotti Rameici (max 6 kg/ha) o Thiram o Ziram (max 1 trattamento) Tra Ziram e Thiram max 2 trattamenti.

COCCINIGLIA DI SAN JOSE': con "Politiol", preparato a base di olio minerale paraffinico e zolfo attivo anche contro ERIOFIDI, **per evitare danni da fitotossicità si dovrà intervenire entro la fase di gemme gonfia**, prima che compaia la nuova vegetazione. Dalla fase di rottura gemme utilizzare Olio minerale o Buprofezin (intervenire nella fase di bottoni fiorali) o Pyriproxifen (max 1 trattamento)

TENTREDINE:dalla fase di bottone bianco installare le trappole cromotropiche bianche.

MELO e PERO fase rigonfiamento gemme – punte verdi

COLPO DI FUOCO e CANCRI RAMEALI eseguire da questa fase un intervento con Prodotti rameici (max 6 kg/ha).

PERO ERIOFIDE RUGGINOSO: con “Politiol”, preparato a base di olio minerale paraffinico e zolfo attivo anche contro ERIOFIDI, **per evitare danni da fitotossicità si dovrà intervenire entro la fase di gemme gonfia**, prima che compaia la nuova vegetazione. In alternativa utilizzare dalla fase di rottura gemme o a caduta petali con Abamectina (in totale max 2 trattamenti)

PERO ERIOFIDE VESCICOLOSO intervenire entro la fase di gemma gonfia con Abamectina (in totale max 2 trattamenti) o “Politiol” o Olio Bianco.

EULIA: installare le trappole per il monitoraggio degli adulti

COCCINIGLIA DI SAN JOSE’: con “Politiol”, preparato a base di olio minerale paraffinico e zolfo attivo anche contro ERIOFIDI, **per evitare danni da fitotossicità si dovrà intervenire entro la fase di gemme gonfia**, prima che compaia la nuova vegetazione. Dalla fase di rottura gemma utilizzare Olio minerale o Buprofezin o Pyriproxifen (max 1 trattamento entro la fase di prefioritura)

TICCHIOLATURA anche se la fase fenologica ha subito un forte si consiglia di eseguire un intervento cautelativo con Prodotti rameici (max 6 kg/ha). Sulle varietà e nelle aree con stadio fenologico più avanzato valutare l’impiego di miscele con Metiram (max 3 trattamenti) o Propineb o Dithianon (PERO max 3 trattamenti; MELO tra Dithianon e Captano max 12 trattamenti per Cvs raccolte prima di Golden, 14 Cvs raccolte da Golden in poi) o Pirimetanil o Ciprodinil (Ciprodinil max 2 trattamenti, 4 in totale tra Ciprodinil e Pirimetanil)

VITE pianto

MAL DELL’ESCA E ALTERAZIONI VASCOLARI durante le operazioni di potatura, si consiglia di eseguire tagli di rinnovo sulle piante che avessero manifestato alterazioni vascolari. Disinfettare le superfici di taglio.

BOSTRICO DELLA VITE nei vigneti in cui si siano registrati attacchi, posizionare le fascine con tralci di potatura ove il fitofago andrà tendenzialmente a deporre le uova. Queste fascine dovranno essere rimosse e distrutte entro metà giugno.

ACARIOSI questo eriofide può causare danni soprattutto negli impianti in allevamento, o in caso di infestazioni rilevate nell’anno precedente. In questi casi si può intervenire entro la fase di gemma cotonosa con “Politiol” (formulato a base di Olio minerale e zolfo)), intervento attivo anche contro COCCINIGLIE..

BOLLETTINO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA
--

Tutte le operazioni colturali devono volgere a mantenere un equilibrio vegeto-produttivo delle piante, al fine di aumentare le difese naturali e diminuire i potenziali attacchi delle avversità, salvaguardando l'ambiente circostante.

COLTURE ARBOREE

ALBICOCCO fase fioritura

MONILIA. Durante la fioritura, in previsione di perturbazioni, intervenire con Zolfo a dosi ridotte o *Bacillus subtilis* (max 4 interventi)

CILIEGIO fase gemma gonfia

CORINEO dalla fase di ingrossamento gemme in presenza di infezione intervenire con Prodotti rameici (max 6 kg /ha anno)

COCCINIGLIA DI SAN JOSE': con "Politiol", preparato a base di olio minerale paraffinico e zolfo attivo anche contro ERIOFIDI, **per evitare danni da fitotossicità si dovrà intervenire entro la fase di gemme gonfia**, prima che compaia la nuova vegetazione. Dalla fase di rottura gemme utilizzare Olio Bianco

PESCO fase bottoni rosa

BOLLA: prosegue la difesa contro la bolla. Eseguire un ulteriore intervento una volta esaurita la persistenza del precedente e solo in previsione di una pioggia infettante.

I prodotti da utilizzare sono: Prodotti Rameici (attivi anche per BATTERIOSI) o Polisolfuro di calcio

AFIDE VERDE se si supera in prefioritura il 3% di germogli infestati intervenire con Piretrine naturali addizionate a Olio Bianco o Sali potassici di acidi grassi.

SHARKA: verificare la presenza di fiori con anomalie del colore, sintomi della virosi.

CIDIA MOLESTA: installare le trappole per il monitoraggio degli adulti. Dove si intendono utilizzare sistemi di confusione/disorientamento ordinare i diffusori

SUSINO fase gemma gonfia – Cino giapponese inizio fioritura

BATTERIOSI: dalla fase di ingrossamento gemme in presenza di infezione intervenire con Prodotti rameici, attivi anche contro CORINEO

COCCINIGLIA DI SAN JOSE': con "Politiol", preparato a base di olio minerale paraffinico e zolfo attivo anche contro ERIOFIDI, **per evitare danni da fitotossicità si dovrà intervenire entro la fase di gemme gonfia**, prima che compaia la nuova vegetazione. Dalla fase di rottura gemme utilizzare Olio Bianco

TENTREDINE: dalla fase di bottone bianco installare le trappole cromotropiche bianche.

MELO e PERO fase rigonfiamento gemme – punte verdi

COLPO DI FUOCO e CANCRI RAMEALI eseguire da questa fase un intervento con Prodotti rameici.

COCCINIGLIA DI SAN JOSE': con "Politiol", preparato a base di olio minerale paraffinico e zolfo attivo anche contro ERIOFIDI, **per evitare danni da fitotossicità si dovrà intervenire entro la fase di gemme gonfia**, prima che compaia la nuova vegetazione. Dalla fase di rottura gemme utilizzare Olio Bianco

TICCHIOLATURA anche se la fase fenologica ha subito un forte si consiglia di eseguire un intervento cautelativo con Prodotti rameici (max 6 kg/ha) o Polisolfuro di Calcio.

VITE pianto

MAL DELL'ESCA E ALTERAZIONI VASCOLARI durante le operazioni di potatura, si consiglia di eseguire tagli di rinnovo sulle piante che avessero manifestato alterazioni vascolari. Disinfettare le superfici di taglio.

BOSTRICO DELLA VITE nei vigneti in cui si siano registrati attacchi, posizionare le fascine con tralci di potatura ove il fitofago andrà tendenzialmente a deporre le uova. Queste fascine dovranno essere rimosse e distrutte entro metà giugno.

APPUNTAMENTI / NOTIZIE / NOTE

Lunedì 13 marzo 2016 presso la sala riunioni della COOPERATIVA FRUIT MODENA GROUP
via Torazzo 2, Sorbara di Bomporto ([mappa](#))
Ore 10.00 aggiornamento del bollettino

Redazione a cura di Massimo Fornaciari e Roberta Nannini

Consorzio Fitosanitario di Modena

Via Santi 14 – Modena

Tel 059/240731 - Fax 059/221877 www.fitosanitario.mo.it



Chi fosse interessato a ricevere il Bollettino di difesa fitosanitaria può farne richiesta a produzioneintegratamodena@fornaciari massimo.com